

在哪里能获得性传播疾病 (STD) 检查?

洛杉矶县公共卫生部下属的健康中心向没有保险或医疗健保医生的个人提供免费或低价服务。

安特洛普谷

Antelope Valley Public Health Center
335-B East Avenue K6
Lancaster, CA 93535
(661)-471-4861

东洛杉矶

Whittier Public Health Center
7643 S. Painter Avenue
Whittier, CA 90602
(562) 464-5350

洛杉矶都会区

- Central Public Health Center
241 N. Figueroa Street
Los Angeles, CA 90012
(213) 288-8204
- Hollywood/Wilshire Public Health Center
5205 Melrose Avenue
Los Angeles, CA 90038
(323) 769-7800

圣费尔南多谷

North Hollywood Public Health Center
5300 Tujunga Avenue
North Hollywood, CA 91601
(818) 766-3982

圣盖博谷

Pomona Public Health Center
750 S. Park Avenue

Pomona, CA 91766
(909) 868-0235

南洛杉矶

- Martin Luther King, Jr. Center for Public Health
11833 South Wilmington Avenue
Los Angeles, CA 90059
(323) 568-8100
- Ruth-Temple Public Health Center
3834 S. Western Avenue
Los Angeles, CA 90062
(323) 730-3507

南湾

- Curtis R. Tucker Public Health Center
123 W. Manchester Blvd.
Inglewood, CA 90301
(310) 419-5325
- Torrance Public Health Center
711 Del Amo Blvd.
Torrance, CA 90502
(310) 354-2300

西洛杉矶

Simms/Mann Health and Wellness Center
2509 Pico Blvd. Rm.325
Santa Monica, CA 90405
(310) 998-3203

网站: www.GetProtectedLA.com

STD 热线 1-800-758-0880

青少年诊所资源: pocketguidela.org

STD 诊所: publichealth.lacounty.gov/dhsp/STDclinics.htm

搜寻诊所 →



STD 真相

性健康
尽在掌握



(下一页) →

什么是性传播疾病 (STD)?

STD 是通过性接触传播的感染。与 STD 感染者进行阴交、口交或肛交都可能被传染。某些 STD 的感染者更有可能感染人类免疫缺陷病毒 (HIV)。

	<ul style="list-style-type: none">• STD 很普遍：1/2 的人在 25 岁前感染一某种 STD。
	<ul style="list-style-type: none">• 很多 STD 感染者没有任何症状。只看一个人的外表无法判断其是否感染 STD。但即便没有症状，STD 仍然能够传播。
	<ul style="list-style-type: none">• 若未经治疗，STD 可能使母亲和婴儿（若您怀孕）遭受严重健康问题。您也可能因此失去受孕能力。
	<ul style="list-style-type: none">• 大多数 STD 可以通过药物治愈。某些 STD 无法治愈，但能够进行治疗。

感染的症状有哪些？

STD 感染通常没有症状。如果症状出现，可能包括：

- **分泌物（滴状或带状）**。男性可能会有白色、黄色或绿色液滴从阴茎流出。女性的阴道分泌物可能在颜色或气味上发生改变。您的肛门分泌物也可能是 STD 的症状。
- **溃疡和肿物**。阴茎、阴道、肛门或口腔及其周围区域出现的溃疡、肿物、水疱或皮疹可能是感染 STD 的症状。溃疡可能是疱疹或梅毒的症状。和皮肤颜色相同的肿物可能是生殖器疣。
- **瘙痒和灼痛**。阴茎、阴道或其它区域的瘙痒可能是虱子（阴虱）的症状。阴道瘙痒可能是阴道炎的症状。感染 STD 后，排尿时可能会有灼痛感。
- **皮疹**。疥疮可能导致全身瘙痒。身体皮疹也可能是梅毒或严重艾滋病的症状。
- **下腹部疼痛**。女性如有下腹痛、发热、经间期阴道出血或性交时疼痛，则可能是盆腔炎 (PID) 的症状。

如何保护自己免于感染 STD?

- **每次性交都使用乳胶避孕套是保护自己免于感染 STD 的最佳途径**。学习如何正确戴套。但是，要知道有些 STD 在使用避孕套的情况下仍能传播。
- **限制性伴侣数量**。您的性伴侣越多，感染 STD 的风险越大。不进行性交是最安全的途径。
- **与性伴侣交谈**。性交前讨论避孕套和健康状况。
- **检查症状**。在性交前讨论 STD。检查自己和性伴侣是否有 STD 常见症状。若您或您的性伴侣有任何症状，则不要进行性交。**进行检查**。
- **定期检查**。您可能感染了 STD 却无任何症状。若您的性伴侣有变、有一位以上性伴侣或您的性伴侣可能与他人性交，则您最好每六个月进行一次检查。让您的性伴侣也进行检查！
- **与医生交谈并了解是否需要暴露前预防 (PrEP) 来预防感染 HIV**。若您已经感染 STD，医生可能会将您性伴侣的药物交给您，这称为患者转交性伴侣治疗 (PDPT)。