



VACUNA CONTRA EL COVID-19: Después de recibir la vacuna Pfizer o Moderna

Efectos secundarios comunes

- Puede tener efectos secundarios de la vacuna en los primeros 2 días después de recibir la vacuna. Los efectos secundarios comunes incluyen brazo dolorido o rojo, fiebre, escalofríos, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza y fatiga.
- Pueden afectar su capacidad para hacer las actividades diarias, pero deberían desaparecer en uno o dos días.
- Son más comunes después de la segunda dosis. Es importante recibir la segunda dosis incluso si tuvo efectos secundarios después de la primera dosis, a menos que un proveedor de vacunas o su médico le dijo que no.
- Los efectos secundarios son normales y muestran que su cuerpo está aprendiendo a desarrollar inmunidad. No todas las personas las conseguirán.

Consejos para ayudar con los efectos secundarios

- Aplique un paño limpio, fresco y húmedo en su brazo para reducir el dolor. También puede ayudar a ejercitar el brazo. Si tiene fiebre, beba muchos líquidos y vístase con ropa ligera.
- Los medicamentos sin receta como el acetaminofeno (Tylenol®) o el ibuprofeno (Motrin® o Advil®) pueden ayudar con dolor, fiebre, dolor de cabeza o malestar.

Cuando llamar a su doctor

Comuníquese con su doctor si tiene:

- Efectos secundarios que duran más de 2 días
- Síntomas que comienzan más de 2 días después de recibir la vacuna
- Tos, dificultad para respirar, moqueo, dolor de garganta o nueva pérdida del gusto u olfato (ya que estos no son efectos secundarios de la vacuna)
- Síntomas que empeoran o le preocupan



Efectos secundarios raros y graves

Reacciones alérgicas

Al igual que con cualquier medicamento es raro pero posible tener una reacción grave, como no poder respirar. Es muy poco probable que esto suceda. Si sucede, llame al 911 o vaya a la sala de emergencias más cercana.

Miocarditis y pericarditis

Ha habido notificaciones de inflamación del músculo cardíaco (miocarditis) o de la capa exterior que recubre el corazón (pericarditis) en algunas personas que recibieron la vacuna Pfizer o Moderna. Estas notificaciones son raras y el riesgo de que esto pase es muy bajo. La mayoría de los casos ocurrieron en adolescentes de sexo masculino y adultos jóvenes y, por lo general, varios días después de la vacunación.

Busque ayuda médica de inmediato si tiene alguno de los siguientes síntomas:

- Dolor de pecho
- Dificultad para respirar
- Sensación de que se le acelera el corazón, o le late con más fuerza

La mayoría de los pacientes con miocarditis y pericarditis que recibieron atención mejoraron con medicamentos y reposo y se sintieron mejor rápidamente.

La vacuna no lo protege de inmediato

Está completamente vacunado **2 semanas** después de recibir su segunda dosis de la vacuna.



Regístrese en V-Safe, el verificador de salud de los CDC

Si tiene un teléfono inteligente, regístrese en vsafe.cdc.gov/es/ para informar a los CDC sobre cualquier efecto secundario.



¿Quiere aprender más?

Para obtener más información, visite la página web "[Después de recibir una vacuna](#)", escanee el código QR, o visite:



[VacunateLosAngeles.com](https://www.vacunatelosangeles.com)

Continúe protegiéndose contra el COVID-19

- Use una mascarilla que se ajuste bien.
- Lávese (o desinfecte) sus manos con frecuencia.
- Quédese en casa cuando esté enfermo.
- Evite lugares llenos de gentes y espacios con poca circulación de aire.
- Mantenga su distancia.



Si está expuesto a alguien con el COVID-19 y está completamente vacunado y no tiene ningún síntoma: no necesita ponerse en cuarentena. Debe hacerse la prueba y monitorear su salud durante 14 días.

Si tiene síntomas de COVID-19: quédese en casa y lejos de los demás. Hable con su médico y hágase una prueba.

Si tiene un sistema inmunológico débil: Si tiene una enfermedad o está tomando medicamentos que debilitan moderada o gravemente su sistema inmunológico, es posible que la vacunación no sea tan eficaz. Los CDC recomiendan que reciba una dosis adicional de vacuna. Hable con su médico. Si necesita recibir la tercera dosis, pregunte cuál es el mejor momento basado en su plan de tratamiento actual.

Para obtener más detalles, visite la página web [Cuándo Ha Sido Completamente Vacunado](#) en el sitio web del DPH del condado de LA.

Controlando del estrés y la salud emocional

A medida que el mundo luchando contra el COVID-19, es posible que se sienta más preocupado y temeroso por su salud, incluida su salud mental.



A continuación, encontrará algunos consejos que le ayudarán a controlar el estrés y mejorar su salud emocional:

- Manténgase virtualmente conectado con la familia y los amigos para evitar el aislamiento social.
- Descanse mucho y coma muchas frutas y verduras. Un cuerpo sano ayuda a mantener una mente sana.
- Medite y haga ejercicio con regularidad.
- Mantenga la higiene personal y mantenga su espacio vital limpio y organizado.
- Agregue estructura a su día - cree una rutina.
- Encuentre formas seguras de disfrutar sus actividades favoritas.
- Limite el tiempo que pasa en las noticias y las redes sociales.



HeadSpace tiene una colección de recursos de meditación y atención plena en inglés y español. También tiene ejercicios de movimiento y sueño para ayudar a controlar el estrés, el miedo y la ansiedad relacionados con el COVID-19.

¡Guarde su tarjeta de vacuna!

Es su registro oficial de vacunación. Tome una foto o haga una copia.

Puede obtener un registro digital de vacunas en myvaccinerecord.cdph.ca.gov

Recursos de salud mental

Si usted o alguien que conoce está teniendo dificultades para sobrellevar el estrés adicional del COVID-19, hay ayuda disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana a través de la Línea de ayuda del Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles. Llame al 1-800-854-7771 o envíe un mensaje de texto con "LA" al 741741. Puede encontrar más recursos y herramientas (incluyendo el acceso a Headspace) en:

<http://dmh.lacounty.gov/resources>

