Juegue Seguro

La Shingella se puede propagar entre hombres que tienen sexo con hombres.

- La shigella se propaga fácilmente por cualquier contacto con las heces (caca)
- Hay un alto riesgo de contraerlo durante el sexo oral o anal (“rimming”, “fisting”) y cuando utiliza juguetes anales.
- La shigella causa diarrea con sangre, retortijones y fiebre.
- Puede ser una enfermedad grave, especialmente si usted tiene VIH

Si piensa que tiene shingella hable con su proveedor de atención médica. Si no tiene un proveedor, llame al 2-1-1 para averiguar cómo puede obtener atención médica.

Public Health

Juegue Seguro

La Shingella se puede propagar entre hombres que tienen sexo con hombres.

- La shigella se propaga fácilmente por cualquier contacto con las heces (caca)
- Hay un alto riesgo de contraerlo durante el sexo oral o anal (“rimming”, “fisting”) y cuando utiliza juguetes anales.
- La shigella causa diarrea con sangre, retortijones y fiebre.
- Puede ser una enfermedad grave, especialmente si usted tiene VIH

Si piensa que tiene shingella hable con su proveedor de atención médica. Si no tiene un proveedor, llame al 2-1-1 para averiguar cómo puede obtener atención médica.

Public Health

Juegue Seguro

La Shingella se puede propagar entre hombres que tienen sexo con hombres.

- La shigella se propaga fácilmente por cualquier contacto con las heces (caca)
- Hay un alto riesgo de contraerlo durante el sexo oral o anal (“rimming”, “fisting”) y cuando utiliza juguetes anales.
- La shigella causa diarrea con sangre, retortijones y fiebre.
- Puede ser una enfermedad grave, especialmente si usted tiene VIH

Si piensa que tiene shingella hable con su proveedor de atención médica. Si no tiene un proveedor, llame al 2-1-1 para averiguar cómo puede obtener atención médica.

Public Health

Juegue Seguro

La Shingella se puede propagar entre hombres que tienen sexo con hombres.

- La shigella se propaga fácilmente por cualquier contacto con las heces (caca)
- Hay un alto riesgo de contraerlo durante el sexo oral o anal (“rimming”, “fisting”) y cuando utiliza juguetes anales.
- La shigella causa diarrea con sangre, retortijones y fiebre.
- Puede ser una enfermedad grave, especialmente si usted tiene VIH

Si piensa que tiene shingella hable con su proveedor de atención médica. Si no tiene un proveedor, llame al 2-1-1 para averiguar cómo puede obtener atención médica.

Public Health

Juegue Seguro

Usted puede prevenir la Shingella. Aquí esta como:

- No deje que caca se meta en su boca.
- Lave sus manos, pene, glúteos, y juguetes sexuales con jabón antes y después de tener sexo.
- Si no tiene agua y jabón, utilice toallitas o desinfectante (gel para las manos).
- Evite tener relaciones sexuales si usted o su pareja tiene diarrea, o ha tenido diarrea en las últimas 2 semanas.

Public Health

Revised 11/7/2016

Juegue Seguro

Usted puede prevenir la Shingella. Aquí esta como:

- No deje que caca se meta en su boca.
- Lave sus manos, pene, glúteos, y juguetes sexuales con jabón antes y después de tener sexo.
- Si no tiene agua y jabón, utilice toallitas o desinfectante (gel para las manos).
- Evite tener relaciones sexuales si usted o su pareja tiene diarrea, o ha tenido diarrea en las últimas 2 semanas.

Public Health

Revised 11/7/2016

Juegue Seguro

Usted puede prevenir la Shingella. Aquí esta como:

- No deje que caca se meta en su boca.
- Lave sus manos, pene, glúteos, y juguetes sexuales con jabón antes y después de tener sexo.
- Si no tiene agua y jabón, utilice toallitas o desinfectante (gel para las manos).
- Evite tener relaciones sexuales si usted o su pareja tiene diarrea, o ha tenido diarrea en las últimas 2 semanas.

Public Health

Revised 11/7/2016

Juegue Seguro

Usted puede prevenir la Shingella. Aquí esta como:

- No deje que caca se meta en su boca.
- Lave sus manos, pene, glúteos, y juguetes sexuales con jabón antes y después de tener sexo.
- Si no tiene agua y jabón, utilice toallitas o desinfectante (gel para las manos).
- Evite tener relaciones sexuales si usted o su pareja tiene diarrea, o ha tenido diarrea en las últimas 2 semanas.

Public Health

Revised 11/7/2016