



## ماذا يعني "ارتداد" كوفيد-19؟

يحدث ارتداد كوفيد-19 عندما يتحسن المصابون به، ثم تعاود الأعراض الظهور بعد 2-8 أيام من تعافيتهم. قد تكون نتيجة اختبارهم إيجابية مرة أخرى. وقد أُبلغ عن حدوث ذلك مع المرضى الذين عولجوا باستخدام باكسلوفيد (Paxlovid)، وهو حبة مضادة للفيروسات للمساعدة في منع حاجة المرضى المعرضين لمخاطر عالية والمصابين بكوفيد-19 من الدخول إلى المستشفى.

## لماذا يرتد المرض إلى المرضى؟

ليس من الواضح حاليًا سبب حدوث ذلك. تقوم إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وفايزر بمراجعة البيانات وجمع التقارير عن الحالات لاكتساب فهم أفضل لما يحدث لهؤلاء المرضى. في تجارب باكسلوفيد السريرية الأصلية، شهد كل من المرضى الذين تناولوا باكسلوفيد ومن تناولوا الدواء الوهمي (حبوب السكر) ارتدادًا. يعني هذا أن ارتداد كوفيد-19 قد لا يكون مرتبطًا بالدواء.

## إلى متى سيستمر الارتداد؟

في الحالات التي تم وصفها، تحسنت أعراض الارتداد أو أصبحت الاختبارات الإيجابية سلبية في غضون 3 أيام لمعظم الناس.

## هل يمكن لمن يعانون من ارتداد المرض أن يمرضوا لدرجة دخولهم إلى المستشفى؟

يبدو أن المرضى الذين يعانون من الارتداد يعانون من أعراض خفيفة، ولم تكن هناك تقارير عن مرض شديد. ولكن إذا ساءت الأعراض أو لم تتحسن، فمن المهم أن تتصل بطبيبك.

## هل لا يزال يُنصح باستخدام باكسلوفيد لعلاج مرضى كوفيد؟

نعم. لا يزال العلاج باستخدام باكسلوفيد موصى به للمعرضين لخطر الإصابة الحادة ولديهم أعراض كوفيد-19 خفيفة إلى متوسطة. يساعد علاج باكسلوفيد في منع دخول المستشفى والوفاة بسبب كوفيد-19 ويظل أداة مهمة في إبعاد الأشخاص عن المستشفى إذا أصيبوا بالعدوى. يُرجى زيارة [ph.lacounty.gov/covidmedicines](http://ph.lacounty.gov/covidmedicines) للاطلاع على مزيد من المعلومات حول أدوية علاج كوفيد-19.

## كيف أعرف ما إذا كنت مصابًا بارتداد كوفيد-19؟

قد يكون لديك ارتداد كوفيد-19 إذا كنت مصابًا بكوفيد-19 وتحسنت ولكنك تبدأ في الشعور بالأعراض أو جاءت نتيجة اختبارك إيجابية مرة أخرى في غضون عدة أيام من التعافي. على سبيل المثال، أصبت بكوفيد-19 وانتهت فترة العزل ولكنك بدأت تظهر عليك الأعراض مرة أخرى بعد يومين من انتهاء فترة العزل.

## ماذا يجب أن أفعل إذا اعتقدت أن لدي ارتداد كوفيد-19؟

إذا اعتقدت أن لديك حالة ارتداد كوفيد-19، فاعزل نفسك عن الآخرين مرة أخرى. يمكن أن ينتهي عزل ارتداد كوفيد-19 بعد 5 أيام من بدء الارتداد إذا لم تعاني من الحمى لمدة 24 ساعة على الأقل وتحسنت الأعراض. لحماية الآخرين، ارتد **كمامة عالية الوقاية** قرب الآخرين لمدة 10 أيام على الأقل بعد بدء ارتداد المرض لديك.

# الأسئلة الشائعة- ارتداد كوفيد-19 بعد علاج باكسلوفيد



## هل يجب أن أكرر علاجي إذا عانيت من ارتداد كوفيد-19؟

لا، لا يوجد حاليًا دليل على أنك ستحتاج إلى العلاج مرة أخرى أو لتمديد العلاج.

## هل التطعيم يحميني من ارتداد المرض؟

استنادًا إلى البيانات الحالية، يبدو أن عودة موجزة للأعراض قد تحدث لدى بعض الأفراد سواء تم تطعيمهم أم لا أو تم علاجهم بباكسلوفيد أم لا. ما زلنا نتعلم المزيد عن أسباب ارتداد كوفيد-19.

تستمر الأدلة في إظهار أن تطعيمات كوفيد-19 والجرعات المعززة تساعد في حمايتك من الإصابة بالمرض أو المرض الحاد بسبب كوفيد-19.

## هل يمكنني نشر كوفيد-19 إذا كان لدي ارتداد لكوفيد-19؟

نعم، من الممكن أن تنشر كوفيد-19 إذا كان لديك ارتداد بسبب عودة العدوى الخاصة بك. من المهم أن تعيد عزل نفسك عن الآخرين إذا عانيت من ارتداد كوفيد-19.

## هل تعني حالات ارتداد المرض أن الناس يطورون مقاومة لباكسلوفيد؟

حتى الآن لا يوجد دليل على أن الارتداد كان نتيجة مقاومة الفيروس لباكسلوفيد.

## هل يوجد أي شيء آخر يجب أن أفعله إذا واجهت ارتدادًا للمرض؟

إذا كان لديك أي أسئلة أو مخاوف بشأن أعراضك، يرجى الاتصال بطبيبك أو مركز اتصال الصحة العامة على 0473-540 (833). يتواجد الموظفون 7 أيام في الأسبوع من الساعة 8:00 صباحًا حتى 8:30 مساءً للإجابة على الأسئلة.

إذا كنت قد عولجت بباكسلوفيد وتعاني من ارتداد كوفيد-19، نشجعك على إبلاغ فايزر، الشركة المصنعة لباكسلوفيد. يمكنك إرسال معلومات حول حالتك عبر الإنترنت باستخدام [أداة فايزر للإبلاغ عن مسائل السلامة](#) أو [MedWatch](#) التابع لإدارة الغذاء والدواء. ستقوم فايزر وإدارة الغذاء والدواء بمراجعة هذه المعلومات لمساعدتنا على فهم ارتداد كوفيد-19 بشكل أفضل.