



## よくある質問 –

# Paxlovidによる治療後のCOVID-19リバウンド(症状の再発)

### COVID-19リバウンドとは？

COVID-19リバウンドとは、COVID-19感染者の症状が治り、回復した2～8日後に症状が現れ始めることです。また、検査で再び陽性になる場合もあります。Paxlovidによる治療を受けた患者にCOVID-19リバウンドが発生したという報告があります。Paxlovidは、COVID-19に感染した重症化のリスクの高い患者が入院するのを予防するのに役立つ抗ウイルス薬です。

### 患者にリバウンドが起こるのは何故ですか？

現時点では、なぜこれが発生するのかが解明されていません。アメリカ食品医薬品局 (FDA)、米国疾病予防管理センター (CDC)、およびPfizerは、これらの患者の間で何が起きているのかをよりよく理解するために、データを確認し、症例に関する報告を収集しています。Paxlovidの臨床試験では、Paxlovidを投与された患者とプラセボ（砂糖の錠剤）を投与された患者の両方がリバウンドを経験しています。これは、COVID-19リバウンドは投薬とは関係がない可能性があることを意味します。

### リバウンドはどのくらい続きますか？

報告されている症例では、ほとんどの人が3日以内にリバウンド症状が改善、及び/または検査で陽性から陰性になっています。

### リバウンドを経験した人は、入院を要するくらい重症になる可能性がありますか？

リバウンドを起こした患者の症状は軽度のものであり、重症化の報告はまだありません。しかし、症状が悪化したり改善しない場合は、医師に相談することが重要です。

### それでもPaxlovidはCOVID患者を治療するために推奨されていますか？

はい。重症化するリスクが高く、軽度から中等度のCOVID-19の症状がある人には、Paxlovidによる治療が依然として推奨されます。Paxlovid治療薬は、COVID-19による入院や死亡を防ぐのに役立ち、今も尚、感染者が入院せずに済む重要なツールです。COVID-19治療薬に関する詳細情報は、[ph.lacounty.gov/covidmedicines](https://ph.lacounty.gov/covidmedicines) をご覧ください。

### COVID-19 リバウンドが発生したことはどうすれば分かりますか？

COVID-19に感染して改善したが、回復してから数日以内に症状が現れたり、検査で陽性になったりした場合は、COVID-19リバウンドである可能性があります。例：COVID-19に感染し、隔離期間が終了したが、隔離期間を終了してから2日後に再び症状が現れ始めたなど。

### COVID-19リバウンドが発生したらどうすればよいですか？

COVID-19リバウンドの疑いがある場合は、他の人からご自身を隔離してください。COVID-19リバウンドによる隔離は、24時間以上発熱が治まり、症状が改善している場合、リバウンドが発生してから5日後に終了することができます。他の人を保護するために、周囲に他の人がいるときはリバウンドの発生後少なくとも10日間は、[保護機能の高いマスク](#)を着用してください。





## よくある質問 –

# Paxlovidによる治療後のCOVID-19リバウンド(症状の再発)

### COVID-19リバウンドが発生した場合、治療を再度受ける必要がありますか？

いいえ。現在、再度治療を受けたり、治療を延長したりする必要はないという根拠はありません。

### ワクチン接種を受けることで、リバウンドを予防することができますか？

現在のデータに基づく、ワクチン接種の有無、またはPaxlovidの治療を受けているかどうかにかかわらず、個人差はありますが、一時的に症状が戻る場合もあるようです。COVID-19リバウンドの原因については現在研究中です。

COVID-19ワクチン接種及びブースター接種が、COVID-19による症状や重症化を防ぐのに役立つという証拠が引き続き示されています。

### COVID-19リバウンドが発生した場合、周囲にCOVID-19を拡散しますか？

はい、COVID-19リバウンドが発生したら、COVID-19を拡散する可能性があります。これは、感染が再発したためです。COVID-19リバウンドを経験している場合は、他の人からご自身を再度隔離することが重要です。

### リバウンドの症例があるという事実は、人々にPaxlovidに対する耐性ができたという意味ですか？

今のところ、ウイルスがPaxlovidに耐性を持つようになったために、リバウンドが起きたという証拠はありません。

### リバウンドを経験した場合、他にすべきことはありますか？

症状について質問や懸念がある場合は、医師または公衆衛生局のコールセンター：(833) 540-0473までお電話ください。スタッフが（年中無休、8:00 am～8:30 pm）質問にお答えします。

Paxlovidの治療を受け、COVID-19リバウンドを経験した場合は、Paxlovidの製造元であるPfizerに情報を報告することが推奨されます。[Pfizer 安全性報告](#) ツールを使用して、またはFDAの[MedWatch](#)に症例に関する情報をオンラインで送信することができます。PfizerとFDAは、COVID-19リバウンドをよりよく理解するために、報告された情報を調査します。