



자주 묻는 질문 (FAQ): COVID-19 재감염



COVID-19 재감염이란 무엇인가요?

COVID-19 재감염은 COVID-19 확진을 받은 사람이 회복한 후 2~8일 사이에 증상이 다시 발현하는 것을 말합니다. 그리고 재확진 판정도 받을 수 있습니다. COVID-19 재감염은 치료를 받은 사람 뿐 아니라 COVID-19 치료를 받지 않은 사람들도 재감염이 될 수 있습니다.

확진자가 다시 감염되는 이유가 무엇인가요?

현재까지 COVID-19에 재감염되는 이유가 아직 명확하게 밝혀지지 않은 상태입니다. 재감염이 되는 이유와 재감염된 사람들이 다른 사람에게 얼마나 더 자주 전파하는 지에 대해 파악하기 위한 연구가 진행되고 있습니다.

COVID-19 재감염 증세는 얼마나 심한가요?

재감염 시 COVID-19 증상은 보통 경미하게 나타납니다. 재감염된 사람이 중증 COVID-19 질환을 앓을 가능성은 매우 낮습니다.

일부 사람이 재감염된 경우에도 항바이러스 치료제가 권장하나요?

그렇습니다! COVID 감염자에게 치료를 강력히 권장하고 COVID-19 확진자 중에서 증중으로 이어질 수 있는 고위험군인 경우 치료제의 복용을 적극 권장합니다. COVID 치료제 (예: 팍스로비드)는 감염자가 입원하지 않고 사망에 이르지 않도록 도움을 줄 수 있습니다. 미 식품 의약국(FDA)은 팍스로비드와 재감염 간에는 아무런 연관성이 없다고 밝혔습니다.

COVID-19 치료제에 대한 자세한 정보는 ph.lacounty.gov/covidmedicines를 방문하여 확인하세요.

COVID-19에 재감염됐다고 생각하는 경우 어떻게 해야 하나요?

자가 격리를 종료한 후 COVID-19 증상이 재발하거나 증세가 악화되면 항원검사를 다시 받아야 합니다. 검사에서 양성 결과를 받은 경우 0일차를 시작일로 자가 격리를 다시 수행해야 합니다. 내용은 ph.lacounty.gov/covidisolation을 참조 바랍니다.

증상에 대한 질문이나 우려되는 점이 있는 경우 담당 의사에게 연락하세요. 또한 공중 보건국 콜 센터 1-833-540-0473로 전화하실 수도 있습니다. 상담은 주 7일 오전 8시부터 오후 8시 30분까지 연락해주시면 됩니다.

제가 COVID-19에 재감염되는 경우에 COVID-19를 타인에게 전파시킬 수 있나요?

재감염 시 COVID-19를 타인에게 전파시킬 수 있습니다. 이러한 이유로 COVID-19에 재감염되는 경우 다른 사람들을 보호하기 위해 다시 자가 격리를 수행해야 합니다 (위 내용 참조).

COVID-19에 재감염되는 경우 치료를 다시 받아야 하나요?

아닙니다. 재감염되는 경우 치료를 다시 받아야 하거나 치료를 더 장기간 받아야 한다는 근거는 현재까지 없습니다.

