治療 COVID-19 的藥物

如果您出現 COVID-19 症狀，請進行檢測，詢問您的醫生治療藥物是否適合您。

即使症狀輕微，也請立即詢問治療藥物。 儘快開始使用藥物的治療效果最好。

有關更多資訊，包括如何接受 COVID-19 檢測和治療：

- **請訪問** ph.lacounty.gov/covidmedicines
  ph.lacounty.gov/covidtests/
- **請致電公共衛生局呼叫中心 1-833-540-0473，工作時間為每週 7 天，早 8 點至晚 8 點**

必須儘早開始治療

口服藥物必須在症狀出現後 5 天內開始服用；靜脈注射治療應在 7 天內開始。請不要等到症狀惡化才開始治療。

COVID 治療藥物可以幫助您避免罹患重病。

治療也可能幫助您更快地感覺好起來。 此外，早期證據表明，治療可能會使人們更快地檢測呈陰性，並降低患長期 COVID 的風險。

如果有 COVID-19 症狀，並且如果 COVID-19 檢測呈陽性或者醫生建議接受治療，許多成人和一些兒童有資格接受治療。

如果您符合以下條件，就可能有資格接受治療：

- **年齡在 50 歲或以上**，或者
- **未接種疫苗或未接種最新的 COVID-19 疫苗**，或者
- **有一個或多個以下健康狀況或特徵**（即使您之前感染過 COVID-19 或已經接種過疫苗）。

- 是受 COVID 影響格外嚴重的社區的成員
- 癌症
- 腦血管疾病/中風
- 慢性腎臟、肝臟或肺部疾病，包括囊性纖維化、結核病和中度至重度哮喘
- 失智症或其他神經系統疾病
- 糖尿病
- 殘障
- 心臟病
- 免疫系統問題，包括愛滋病毒感染，器官或骨髓移植，或服用類固醇等藥物，化療。
- 精神健康狀況
- 超重、肥胖，或缺乏運動
- 懷孕
- 鐮狀細胞病或地中海貧血
- 目前或以前的吸煙者
- 物質使用障礙

本清單不包括所有可能的疾病或狀況。
有關詳細資訊，請訪問 CDC 網頁「患有某些疾病的人」。

如果您有任何疑問，請聯繫您的醫生。

治療 COVID-19 的藥物

治療 COVID-19 的藥物類型

這些藥物屬於抗病毒治療藥物，它們阻止病毒在體內繁殖。

口服治療藥物：在出現症狀后 *5 天內*開始服用。每天服用兩次，持續 5 天。 最常見的副作用是輕微的。

- Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir)：這是建議大多數人採用的治療方法。體重至少 88 磅的 12 歲及以上的個人可以服用。它非常有效，易於服用且安全。如果您正在服用其他藥物，請諮詢您的醫生。他們可能會告訴您在服用 Paxlovid 期間停止服用其他藥物或減少其他藥物的劑量。
- Molnupiravir (Lagevrio)：適用於不能服用 Paxlovid 或 Remdesivir 的人。它只能供 18 歲及以上且未懷孕的成年人服用。

靜脈注射治療藥物：在出現症狀后 *7 天內*開始使用。

- Remdesivir (Veklury)：適用於不能服用 Paxlovid 的成人和兒童，包括體重至少 3 公斤（約 7 磅）的嬰兒。每天注射一次，持續 3 天。

治療藥物不會導致反彈感染。反彈感染在未接受過治療和接受過治療的人當中的發生率相似。如需更多資訊，請參考「COVID-19 反彈常見問題解答 (FAQ)」。

如何獲得 COVID-19 治療藥物

- **您的醫生、緊急護理中心和一些藥劑師可以給您開處方，**您可以在藥房配藥。如果您需要靜脈注射治療，您的醫生可以將您轉介到適當的地方。
- **公共衛生局遠距醫療服務**：每週 7 天，早 8 點至晚 8 點提供服務，電話為 1-833-540-0473。

  這些服務可讓您輕鬆獲得 COVID-19 檢測和評估，如果您符合條件，還可以獲得口服治療藥物。

如果您需要離家外出就醫，請佩戴合適的呼吸器或醫用口罩，以幫助保護他人。有關詳細資訊，請參閱 ph.lacounty.gov/masks。

為符合資格的患者提供免費或低費用治療藥物

如果您有 Medicaid（聯邦醫療補助）、Medi-Cal（加州醫療補助）或者沒有健康保險，您可能有資格透過一項患者協助計劃獲得免費藥物。如果您有私人保險，您可能在共付額方面獲得幫助。您可以在 paxlovid.com/paxcess 瞭解更多有關 Paxlovid 協助計劃的資訊，以及在 Merckhelps.com 瞭解有關 Lagevrio 協助計劃的資訊。