

جداول لقاحات كوفيد-19 للأشخاص الذين لا يعانون من نقص المناعة

العمر	اللقاح	يجب أن يحصل الجميع على هذه الجرعات السلسلة الأولية من اللقاحات	الجرعة المعززة	قد يتلقى البعض الجرعة المعززة الثانية ¹
11-5	فايزر	الجرعة الأولى الجرعة الثانية 3 أسابيع	غير مسموح بها حالياً	
17-12	فايزر	الجرعة الأولى الجرعة الثانية 3-8 أسابيع	فايزر فقط	
أكثر من 18	فايزر	الجرعة الأولى الجرعة الثانية 3-8 أسابيع	أياً من لقاحات كوفيد-19 ⁴	على الأقل 4 أشهر لعمر +50 فقط ¹
أكثر من 18	موديرنا	الجرعة الأولى الجرعة الثانية 3-8 أسابيع	أياً من لقاحات كوفيد-19 ⁴	على الأقل 4 أشهر لعمر +50 فقط ¹
أكثر من 18	جونسون وجونسون	الجرعة الأولى	أياً من لقاحات كوفيد-19 ⁴	على الأقل 4 أشهر لعمر +50 و+18 لمن تلقى جرعتي جونسون أند جونسون ¹

إذا كنت مصاباً بكوفيد-19، فانتظر حتى تتعافى (إذا كانت لديك أعراض) وتنتهي من العزل للحصول على أي جرعات من لقاح كوفيد-19. قد تفكر في تأخير الجرعة (الجرعات) المعززة لمدة 3 أشهر إذا أصبت مؤخراً.

1. إذا كان عمرك 50 عاماً أو أكثر أو كان عمرك 18-49 عاماً وتلقيت لقاح جونسون وجونسون لكل من جرعتك الأولية والمعززة من اللقاحات، فقد تختار تلقي جرعة معززة ثانية. انظر [التفكير في تلقي جرعة معززة ثانية](#).
2. لقاح فايزر هو لقاح كوفيد-19 الوحيد المصرح به للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً. يحتوي لقاح فايزر المخصص للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عاماً على نفس المكونات النشطة مثل اللقاح المخصص للبالغين، ولكنه يكون بجرعة أصغر (ثلث الجرعة).
3. موعد الجرعة الثانية. قد تكون مدة 8 أسابيع هو الأفضل لمعظم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 64 عاماً. ينصح بمدة 3 أسابيع لمن هم في سن 65 وما فوق أو أولئك الذين يحتاجون إلى حماية سريعة. انظر [موعد الجرعة الثانية من لقاحات فايزر أو موديرنا](#).
4. يُفضل تلقي لقاحات فايزر وموديرنا على لقاح جونسون وجونسون لجميع الجرعات. يُعطى لقاح جونسون وجونسون في بعض الحالات.

جداول لقاحات كوفيد-19 للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة 1

العمر	اللقاح	يجب أن يحصل الجميع على هذه الجرعات السلسلة الأولية من اللقاحات	الجرعة المعززة	قد يتلقى البعض الجرعة المعززة الثانية ²
11-5	فايزر	الجرعة الأولى 3 أسابيع الجرعة الثانية 4 أسابيع على الأقل الجرعة الثالثة	غير مسموح بها حاليًا	
17-12	فايزر	الجرعة الأولى 3 أسابيع الجرعة الثانية 4 أسابيع على الأقل الجرعة الثالثة	فايزر فقط	فايزر فقط
أكثر من 18	فايزر	الجرعة الأولى 3 أسابيع الجرعة الثانية 4 أسابيع على الأقل الجرعة الثالثة	أيًا من لقاحات كوفيد-219	فايزر أو موديرنا فقط
أكثر من 18	موديرنا	الجرعة الأولى 4 أسابيع الجرعة الثانية 4 أسابيع على الأقل الجرعة الثالثة	أيًا من لقاحات كوفيد-219	فايزر أو موديرنا فقط
أكثر من 18	وجونسون وجونسون	الجرعة الأولى 4 أسابيع على الأقل الجرعة الثانية فايزر أو موديرنا فقط	أيًا من لقاحات كوفيد-219	فايزر أو موديرنا فقط

إذا كنت مصابًا بكوفيد-19، فانتظر حتى تتعافى (إذا كانت لديك أعراض) وتنتهي من العزل للحصول على أي جرعات من لقاح كوفيد-19.

- يجب أن يحصل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 5 سنوات أو أكثر والذين يعانون من ضعف متوسط أو شديد في جهاز المناعة (مثل السرطانات المرتبطة بالدم، أو يتلقون علاجات معينة للسرطان وزرع الأعضاء، وبعض أمراض المناعة الذاتية) على جرعة أولية إضافية. إذا كانوا أكبر من 12 عام، يجب أن يحصلوا على جرعة (جرعات) معززة.
- من تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر لديهم خيار الحصول على جرعة معززة ثانية. يجب أن يفكروا في الحصول على هذه الجرعة في أقرب وقت ممكن واستشارة طبيبيهم حول أفضل توقيت بناءً على الأخطار وخطة العلاج. انظر التفكير في تلقي جرعة معززة ثانية.
- يُفضل تلقي لقاحات فايزر وموديرنا على لقاح جونسون وجونسون لجميع الجرعات. يُعطى لقاح جونسون وجونسون في بعض الحالات.

جداول لقاحات كوفيد-19

جرعة [جرعات] معززة / إضافية للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل 1,2 بسلسلة لقاحات خارج الولايات المتحدة، في تجربة سريرية، أو في حال تلقي مزيجًا مطابقًا من اللقاحات

يجب أن يتبع الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل بسلسلة أولية من لقاح كوفيد-19 غير المعتمدة / المصرح بها من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الجداول أدناه لجرعات اللقاحات المعززة و / أو الجرعات الإضافية من لقاح كوفيد-19.

العمر	اللقاح	يجب أن يحصل الجميع على هذه الجرعات السلسلة الأولية من اللقاحات	الجرعة المعززة	قد يتلقى البعض الجرعة المعززة الثانية ³
أكثر من 12	لقاح غير مصرح به / غير معتمد من إدارة الغذاء والدواء	الجرعة الأولى الفاصل الزمني الموصى به	الجرعة الثانية على الأقل 5 أشهر	فايزر أو موديرنا ⁴ فقط (17-12، فايزر فقط) على الأقل 4 أشهر
أكثر من 12 مع ضعف جهاز المناعة	لقاح غير مصرح به / غير معتمد من إدارة الغذاء والدواء	الجرعة الأولى الفاصل الزمني الموصى به	الجرعة الثانية على الأقل 4 أسابيع الجرعة الثالثة فايزر أو موديرنا (17-12، فايزر فقط) على الأقل 3 أشهر	فايزر أو موديرنا ⁴ فقط (17-12، فايزر فقط) على الأقل 4 أشهر

ملحوظة: إذا أصبت مؤخرًا بكوفيد-19، فقد تفكر في تأخير الجرعة (الجرعات) المعززة لمدة 3 أشهر.

1. تعتبر قد تم تطعيمك بالكامل بعد أسبوعين من تلقي:

- الجرعة النهائية من سلسلة اللقاحات المدرجة للاستخدام في حالات الطوارئ من قبل منظمة الصحة العالمية. حاليًا، هذا الأمر يشمل لقاح أسترا زينيكا أكسفورد (فاكزيفريا)، من معهد الهمد للأصصال (لقاح كوفيشيلد وكوفوفاكس)، (لقاح سينوفارم) من BIBP، لقاح كورونافاك من Sinovac، (لقاح كوفافاكسين) من بهارات بيونتيك الدولية، و(لقاح نوفاكسوفيد) من نوفافاكس. انظر قائمة كوفيد-19 الحالية لمنظمة الصحة العالمية.
 - الجرعة النهائية من مجموعة "المزيج والمطابقة" من اللقاحات المعتمدة / المصرح بها من قبل إدارة الغذاء والدواء و / أو اللقاحات المدرجة في قائمة منظمة الصحة العالمية (فقط إذا كانت الجرعتان الأوليتان يفصل بينهما 17 يومًا على الأقل).
 - جميع لقاحات كوفيد-19 "النشطة" الموصى بها (وليس الدواء الوهمي) في تجربة اللقاح السريري. ملحوظة: يجب أن يكون اللقاح إما لقاحًا مدرجًا في قائمة منظمة الصحة العالمية غير معتمد / مصرح به من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أو أن يكون لقاحًا أكدت فعاليته لجنة مراقبة البيانات والسلامة الأمريكية أو ما يوازيها بشكل مستقل.
2. إذا كنت لا تستوفي معايير التطعيم الكامل، فيجب عليك مراجعة لقاحات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC خارج الولايات المتحدة / خارج التجارب السريرية، الملحقان A و B.
3. يمكنك اختيار الحصول على جرعة معززة ثانية (من لقاحات فايزر أو موديرنا فقط) إذا كان عمرك 50 عامًا أو أكثر أو إذا كنت تعاني من نقص المناعة (ضعف جهاز المناعة) بشكل معتدل أو شديد. إذا كان عمرك يتراوح بين 12 و 17 عامًا، فيمكنك تلقي لقاح فايزر فقط. انظر التفكير في تلقي جرعة معززة ثانية.
4. لقاحا فايزر وموديرنا لغيروس كوفيد-19 هما اللقاحان الوحيدان المصرح بهما كجرعة إضافية أو معززة للأشخاص الذين لم يتلقوا السلسلة الأولية من لقاحات كوفيد-19 المرخصة / المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا تلقي لقاح فايزر فقط.

لمزيد من المعلومات، راجع القسم متى يمكنني تلقي لقاحات كوفيد-19 الخاصة بي على صفحة الويب "بمجرد تلقي اللقاح".