

CALENDARIOS DE VACUNAS CONTRA EL COVID-19

Adultos 18+

(Si tiene una sistema inmunitario debilitado, consulte *Adultos 18+ con sistemas inmunológicos débiles*)

Edad	Vacuna	Serie Primaria	Dosis de refuerzo #1	Dosis de refuerzo #2 ¹
18+	Pfizer	Dosis 1 → 3-8 semanas ² → Dosis 2	Al menos 5 meses → Dosis de refuerzo Cualquier vacuna contra el COVID-19 ³	Al menos 4 meses Solo para edades 50+ ¹ → Dosis de refuerzo Solo Pfizer o Moderna
18+	Moderna	Dosis 1 → 4-8 semanas ² → Dosis 2	Al menos 5 meses → Dosis de refuerzo Cualquier vacuna contra el COVID-19 ³	Al menos 4 meses Solo para edades 50+ ¹ → Dosis de refuerzo Solo Pfizer o Moderna
18+	Novavax	Dosis 1 → 3-8 semanas ² → Dosis 2	Por el momento no se recomiendan dosis de refuerzo	
18+	Johnson & Johnson (J&J) ³	Dosis 1	Al menos 2 meses → Dosis de refuerzo Cualquier vacuna contra el COVID-19 ³	Al menos 4 meses Para 50+ y para 18+ con 2 dosis de J&J ¹ → Dosis de refuerzo Solo Pfizer o Moderna

Si tiene COVID-19, espere hasta que se haya recuperado de su enfermedad (si tenía síntomas) y su período de aislamiento haya terminado para recibir cualquier dosis de vacuna contra el COVID-19. Si recientemente tuvo COVID-19, puede considerar retrasar una dosis de vacuna (serie primaria o dosis de refuerzo) por 3 meses desde que comenzaron sus síntomas o su prueba dio positivo (si no tuvo ningún síntoma).

- Si tiene 50 años o más, debería recibir una segunda dosis de refuerzo. Si tiene entre 18 y 49 años y recibió dos dosis de la vacuna J&J, puede recibir una segunda dosis de refuerzo. Consulte [Dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19](#).
- Programación de la segunda dosis: 8 semanas puede ser lo mejor para algunas personas menores de 65 años, hombres menores de 40 años. Tres semanas (para Pfizer y Novavax) o 4 semanas (Moderna) se recomiendan para personas 65+, personas más propensas a enfermarse gravemente por el COVID-19, o cualquier persona que necesite la protección más completa posible antes. Consulte [Mantenga sus vacunas contra el COVID-19 al día](#).
- Se recomienda las vacunas Pfizer, Moderna, y Novavax a la vacuna J&J para todas las dosis. J&J se puede ofrecer en [algunas situaciones](#).

CALENDARIOS DE VACUNAS CONTRA EL COVID-19

Adultos 18+ con sistemas inmunológicos débiles

Edad	Vacuna	Serie Primaria	Dosis de refuerzo #1	Dosis de refuerzo #2
18+	Pfizer	Dosis 1 → 3 semanas → Dosis 2 → Al menos 4 semanas → Dosis 3	Dosis de refuerzo (Cualquier vacuna contra el COVID-19 ¹)	Dosis de refuerzo (Solo Pfizer o Moderna)
18+	Moderna	Dosis 1 → 4 semanas → Dosis 2 → Al menos 4 semanas → Dosis 3	Dosis de refuerzo (Cualquier vacuna contra el COVID-19 ¹)	Dosis de refuerzo (Solo Pfizer o Moderna)
18+	Novavax	Dosis 1 → 3 semanas → Dosis 2	Por el momento no se recomiendan dosis de refuerzo	
18+	Johnson & Johnson (J&J) ¹	Dosis 1 → Al menos 4 semanas → Dosis 2 (Solo Pfizer o Moderna)	Dosis de refuerzo (Cualquier vacuna contra el COVID-19 ¹)	Dosis de refuerzo (Solo Pfizer o Moderna)

Si tiene un sistema inmunológico **moderado o gravemente inmunodeprimido** (p. ej., un cáncer relacionado con la sangre, trasplantes de órganos, ciertas condiciones autoinmunes, o ciertos tratamientos para el cáncer), se recomienda que reciba dosis adicionales de la vacuna contra el COVID-19 (a menos que haya recibido la vacuna Novavax). Hable con su médico sobre el mejor momento de las dosis según sus riesgos y plan de tratamiento.

Si tiene **COVID-19**, espere hasta que se haya recuperado de su enfermedad (si tenía síntomas) y su período de aislamiento haya terminado para recibir cualquier dosis de vacuna contra el COVID-19.

1. Se recomiendan las vacunas Pfizer, Moderna, y Novavax a la vacuna J&J para todas las dosis. J&J se puede ser ofrecida en [algunas situaciones](#).