












COVID-19-ի դեմ ՊԱՏՎԱՍՏՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Իմունային անբավարարություն չունեցող անձանց համար

Տարիք	Պատվաստանյութ	ԲՈՒՈՐԸ ՊԵՏՔ Է ՍՏԱՆԱԼ ԱՅՍ ԴԵՂԱԶԱՓԵՐԸ	Խթանիչ Դեղաչափ	ՈՐՈՇ ՄԱՐԴԻԿ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՍՏԱՆԱԼ 2-ՐԴ ԽԹԱՆԻՉ ԴԵՂԱԶԱՓ ¹
5-11	Pfizer ²	 3 շաբաթ  1-ին Դեղաչափ 2-րդ Դեղաչափ	Այս պահին թույլատրված չէ	
12-17	Pfizer ²	 3-8 շաբաթ ³  Առնվազն 5 ամիս 1-ին Դեղաչափ 2-րդ Դեղաչափ	Միայն Pfizer	
18+	Pfizer	 3-8 շաբաթ ³  Առնվազն 5 ամիս 1-ին Դեղաչափ 2-րդ Դեղաչափ	COVID-19-ի դեմ ցանկացած պատվաստանյութ ⁴	Առնվազն 4 ամիս Միայն 50+ տարիքի անձանց համար ¹ 
18+	Moderna	 4-8 շաբաթ ³  Առնվազն 5 ամիս 1-ին Դեղաչափ 2-րդ Դեղաչափ	COVID-19-ի դեմ ցանկացած պատվաստանյութ ⁴	Առնվազն 4 ամիս Միայն 50+ տարիքի անձանց համար ¹ 
18+	Johnson & Johnson	 Առնվազն 5 ամիս 1-ին Դեղաչափ	COVID-19-ի դեմ ցանկացած պատվաստանյութ ⁴	Առնվազն 4 ամիս 50+ տարիքի եւ J&J-ի 2 դեղաչափի ստացած 18+ տարիքի անձանց համար կամ Միայն Pfizer կամ Moderna

Եթե դուք վարակված եք COVID-19-ով, սպասեք մինչև ապաքինվեք (եթե ունեք ախտահանում) և ավարտեք մեկուսացումը՝ COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութի դեմ ցանկացած դեղաչափի ստանալու համար: Դուք կարող եք դիտարկել 3 ամսով ձեր խթանիչ դեղաչափի(եր)ի հետաձգումը, եթե վերջերս վարակվել եք:

1. Եթե դուք 50 տարեկան եք կամ ավելի բարձր տարիքի ԿԱՍ 18-49 տարեկան եք և պատվաստվել եք J&J պատվաստանյութով ԻՆՉՊԵՍ ձեր 1-ին դեղաչափը, ԱՅՆՊԵՍ էլ խթանիչ դեղաչափը ստանալու, կարող եք ձեր ցանկությամբ ստանալ 2-րդ խթանիչ դեղաչափը: Տե՛ս [2-րդ խթանիչ Դեղաչափի Դիտարկումը](#):
2. Pfizer պատվաստանյութը COVID-19-ի դեմ միակ պատվաստանյութն է, որը թույլատրված է 18 տարեկանից փոքր անձանց: 5-11 տարեկան երեխաների համար նախատեսված Pfizer պատվաստանյութն ունի նույն ակտիվ բաղադրիչները, ինչ մեծահասակների պատվաստանյութը, սակայն պարունակում է ավելի փոքր չափաբաժին (դեղաչափի 1/3-ը):
3. 2-րդ դեղաչափի ընդունման ժամանակը: 8 շաբաթ ընդմիջում կարող է լավագույնը լինել 12-64 տարեկան մարդկանցից շատերի համար: 65 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի կամ շտապ պաշտպանության կարիք ունեցող անձանց խորհուրդ է տրվում 3 շաբաթ ընդմիջում: Տե՛ս [Pfizer կամ Moderna պատվաստանյութերի 2-րդ դեղաչափի ընդունման ժամկետները](#):
4. Pfizer և Moderna պատվաստանյութերը նախընտրելի են J&J պատվաստանյութից բոլոր դեղաչափերի դեպքում: J&J պատվաստանյութն առաջարկվում է [ոռոշ հրավիրմաներում](#):



COVID-19-ի ԴԵՄ ՊԱՏՎԱՍՏՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Իմունային անբավարարություն¹ ունեցող անձանց համար

Տարիք	Պատվաստանյութ	ԲՈԼՈՐԸ ՊԵՏԶ Է ՍՏԱՆԱՆ ԱՅՍ ԴԵՂԱԶԱԹԵՐԸ Հիմնական Շարք	Խթանիչ Դեղաչափ	ՈՐՈՇ ՄԱՐԴԻԿ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՍՏԱՆԱԼ 2-ՐԴ ԽԹԱՆԻՉ ԴԵՂԱԶԱԹ ²
5-11	Pfizer	<p>1-ին Դեղաչափ 2-րդ Դեղաչափ 3-րդ Դեղաչափ</p>	Այս պահին թույլատրված չէ	
12-17	Pfizer	<p>1-ին Դեղաչափ 2-րդ Դեղաչափ 3-րդ Դեղաչափ</p>	Առնվազն 3 ամիս	Առնվազն 4 ամիս
18+	Pfizer	<p>1-ին Դեղաչափ 2-րդ Դեղաչափ 3-րդ Դեղաչափ</p>	Առնվազն 3 ամիս	Առնվազն 4 ամիս
18+	Moderna	<p>1-ին Դեղաչափ 2-րդ Դեղաչափ 3-րդ Դեղաչափ</p>	Առնվազն 3 ամիս	Առնվազն 4 ամիս
18+	Johnson & Johnson	<p>1-ին Դեղաչափ 2-րդ Դեղաչափ</p> <p>Միայն Pfizer կամ Moderna</p>	Առնվազն 2 ամիս	Առնվազն 4 ամիս

Եթե վարակված եք COVID-19-ով, սպասեք մինչև ապացիվվեք (եթե ունեք ախտահիշներ) և ավարտեք մեկուսացումը՝ COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութի ցանկացած դեղաչափ ստանալու համար:

- 5 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի միջին կամ խստորեն թուլացած իմունային համակարգ (օրինակ՝ արյան քաղցկեղ կամ քաղցկեղի բուժում, օրգանների փոխպատվաստում և որոշակի աուտոիմունային հիվանդություններ) ունեցող անձինք պետք է ստանան լրացուցիչ հիմնական դեղաչափ: Եթե 12+ տարեկան են, պետք է ստանան նաև խթանիչ դեղաչափ(եր)ը:
- 12 տարեկան և ավելի մեծ տարիքի անձինք հնարավորություն ունեն ստանալ 2-րդ խթանիչ դեղաչափ: Նրանք պետք է դիտարկեն այս դեղաչափը հնարավորինս շուտ ստանալը և իրենց բժշկի հետ խոսեն դեղաչափը ստանալու լավագույն ժամանակի մասին՝ ելնելով իրենց առողջության վտանգներից և բուժման ծրագրից: Տե՛ս [2-րդ խթանիչ Դեղաչափի Դիտարկում](#):
- Pfizer և Moderna պատվաստանյութերը նախընտրելի են J&J պատվաստանյութից բոլոր դեղաչափերի դեպքում: J&J պատվաստանյութն առաջարկվում է [որոշ իրավիճակներում](#):

COVID-19-ի դեմ ՊԱՏՎԱՍՏՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Խթանիչ/լրացուցիչ դեղաչափ(եր) այն մարդկանց համար, որոնք լիովին պատվաստված են^{1,2} ԱՄՆ-ից դուրս տրվող պատվաստանյութով, կլինիկական փորձարկումների շրջանակում, կամ պատվաստվել են միախառնում և համադրում տարբերակով

Մարդիկ, ովքեր համարվում են լիովին պատվաստված COVID-19 -ի դեմ ոչ FDA-ի կողմից հաստատված/թույլատրված պատվաստանյութի հիմնական շարքով, պետք է հետևեն ստորև նշված ժամանակացույցերին՝ COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութի խթանիչ/լրացուցիչ դեղաչափերի համար:

Տարիք	Պատվաստանյութ	ԲՈՒՈՐԸ ՊԵՏԵ Է ՍՏԱՆԱՆ ԱՅՍ ԴԵՂԱՉԱՓԵՐԸ			Խթանիչ Դեղաչափ	ՈՐՈՇ ՄԱՐԴԻԿ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՍՏԱՆԱՆ 2-ՐԴ ԽԹԱՆԻՉ ԴԵՂԱՉԱՓ ³
		Հիմնական շարք				
12+	Ոչ FDA-ի կողմից թույլատրված/հաստատված պատվաստանյութ	1-ին Դեղաչափ	2-րդ Դեղաչափ	Առնվազն 5 ամիս	Pfizer կամ Moderna ⁴ (12-17՝ միայն Pfizer)	Առնվազն 4 ամիս Pfizer կամ Moderna ⁴ միայն 50+ տարիքի անձանց համար ³
12+ թուլացած իմունային համակարգ ունեցող	Ոչ FDA-ի կողմից թույլատրված/հաստատված պատվաստանյութ	1-ին Դեղաչափ	2-րդ Դեղաչափ	Առնվազն 4 շաբաթ	3-րդ Դեղաչափ Pfizer կամ Moderna ⁴ (12-17՝ միայն Pfizer)	Առնվազն 3 ամիս Pfizer կամ Moderna ⁴ (12-17՝ միայն Pfizer)
						Առնվազն 4 ամիս Pfizer կամ Moderna ^{3,4} (12-17՝ միայն Pfizer)

Եթե դուք վերջերս վարակվել եք COVID-19-ով, կարող եք դիտարկել 3 ամսով ձեր խթանիչ դեղաչափ(եր)ի հետաձգումը:

- Դուք համարվում եք լիովին պատվաստված, եթե անցել է 2 շաբաթ՝
 - Այն պատվաստանյութերի շարքի վերջնական դեղաչափը ստանալուց, որը նշված է Առողջապահության Զամաշխարհային Կազմակերպության (ԱԶԿ) [արտակարգ իրավիճակներում օգտագործման ցանկում](#): Ներկայումս ցանկը ներառում է AstraZeneca-Oxford (Vaxzevria), Զնդկաստանի Շիճուկային Ինստիտուտ Մասնավոր ՍՊԸ (Covishield և Covovax), BIBP (Sinopharm), Sinovac (CoronaVac), Bharat Biotech International (Covaxin) և Novavax (Nuvaxovid) պատվաստանյութերը: Տե՛ս [COVID-19-ի Զամար ԱԶԿ-ի Արտակարգ Իրավիճակներում Օգտագործման Ներկայիս ցանկը](#):
 - FDA-ի կողմից հաստատված/թույլատրված և/կամ ԱԶԿ-ի ցանկում նշված պատվաստանյութերի «միախառնում և համադրում» (mix and match) համակցության վերջնական դեղաչափը ստանալուց (միայն այն դեպքում, եթե առաջին 2 դեղաչափերը տրվել են առնվազն 17 օր ընդմիջումով):
 - Պատվաստանյութերի կլինիկական փորձարկումներում ընդգրկված COVID-19-ի դեմ առաջարկվող բոլոր «ակտիվ» պատվաստանյութերը (ոչ պլացեբո) ստանալուց: Ծանոթություն. պատվաստանյութը պետք է լինի ԱԶԿ-ի ցանկում նշված պատվաստանյութ, որը հաստատված/թույլատրված չէ FDA-ի կողմից, կամ պատվաստանյութ, որի [արդյունավետությունը անկախորեն հաստատվել է](#) ԱՄՆ տվյալների և անվտանգության վերահսկողության խորհրդի կամ համարժեք մարմնի կողմից:
- Եթե դուք չեք բավարարում լիովին պատվաստման չափանիշները, այցելեք CDC-ի [պատվաստումը ԱՄՆ-ից դուրս/ կլինիկական փորձարկումների շրջանակում փաստաթղթի A և B Զավելվածները](#):
- Դուք կարող եք ձեր ցանկությամբ ստանալ 2-րդ խթանիչ դեղաչափը (միայն Pfizer կամ Moderna պատվաստանյութ), եթե դուք 50 տարեկան եք կամ ավելի բարձր տարիքի: ԿԱՄ եթե ունեք [վիզի կամ խիստ իմունային անբավարարություն](#) (թույլ իմունային համակարգ): Եթե դուք 12-17 տարեկան եք, կարող եք պատվաստվել միայն Pfizer պատվաստանյութով: Տե՛ս [2-րդ խթանիչ Դեղաչափի Դիտարկում](#):
- COVID-19-ի դեմ Pfizer և Moderna պատվաստանյութերը միակ պատվաստանյութերն են, որոնք թույլատրված են որպես լրացուցիչ կամ խթանիչ դեղաչափեր այն մարդկանց համար, որոնք չեն ստացել COVID-19 -ի դեմ FDA-ի կողմից թույլատրված/հաստատված պատվաստանյութերի հիմնական շարքը: 12-17 տարեկան երեխաները կարող են պատվաստվել միայն Pfizer պատվաստանյութով:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք Պատվաստվելուց Զետո կայքէջի [Ե՞րբ է COVID-19-ի դեմ իմ պատվաստման կարգավիճակը արդիական](#) բաժինը:

