

CALENDARIOS DE VACUNAS CONTRA EL COVID-19

Niños de 6 meses a 17 años de edad

(Si su niño tiene una sistema inmunitario debilitado, consulte Niños con sistemas inmunológicos débiles)

Edad	Vacuna	Serie Primaria	Dosis de refuerzo
6 meses - 4 años	Pfizer		Por el momento no se recomienda un refuerzo
5-17 años	Pfizer		 Solo Pfizer
6 meses - 17 años	Moderna		Por el momento no se recomienda un refuerzo

- **La dosis de la vacuna contra el COVID-19 se basa en la edad de su hijo el día de la vacunación, no en su tamaño o peso.** Los niños mayores de 12 años reciben la misma dosis de vacuna que los adolescentes y adultos. Los niños menores de 12 años reciben dosis más bajas.
- **Las vacunas contra el COVID-19 y otras vacunas infantiles de rutina se pueden administrar en la misma visita.**
- **El momento para recibir la segunda dosis:** 8 semanas puede ser lo mejor para algunos niños y adolescentes, especialmente los varones de 12 años o más. Un tiempo más largo entre la primera y la segunda dosis puede aumentar la protección que ofrecen las vacunas y reducir el raro riesgo de problemas cardíacos (miocarditis y pericarditis). Se recomienda 3 semanas (Pfizer) o 4 semanas (Moderna) de diferencia para aquellos que necesitan la protección más completa posible antes. Hable con su médico si no está seguro de cuál es el mejor momento para su situación. Consulte la [Programación de la segunda dosis primaria](#) de Pfizer o Moderna.
- **Si su hijo ya tuvo el COVID-19, aún debería vacunarse.** Espere hasta que se hayan recuperado (si tenían síntomas) y terminado el aislamiento para recibir cualquier vacuna, incluida la vacuna contra el COVID-19. Si recientemente tuvo COVID-19, puede considerar retrasar la dosis de la vacuna contra el COVID-19 (serie primaria o refuerzo) por 3 meses desde que comenzaron los síntomas o cuando dieron positivo por primera vez (si no tenían ningún síntoma).
- **Para más información,** consulte la página web de los CDC, [Recomendaciones sobre las vacunas contra el COVID-19 para niños y adolescentes.](#)

CALENDARIOS DE VACUNAS CONTRA EL COVID-19

Niños de 6 meses – 17 años de edad con sistemas inmunológicos débiles

Edad	Vacuna	Serie Primaria	Dosis de refuerzo #1	Dosis de refuerzo #2
6 meses - 4 años	Pfizer			Por el momento no se recomiendan dosis de refuerzo
5-11 años	Pfizer		Solo Pfizer	Por el momento no se recomienda una segunda dosis de refuerzo
12-17 años	Pfizer		Solo Pfizer	Al menos 4 meses → Dosis de refuerzo (Solo Pfizer)
6 meses - 17 años	Moderna			Por el momento no se recomiendan dosis de refuerzo

- **La dosis de la vacuna contra el COVID-19 se basa en la edad de su hijo el día de la vacunación, no en su tamaño o peso.** Los niños mayores de 12 años reciben la misma dosis de vacuna que los adolescentes y adultos. Los niños menores de 12 años reciben dosis más bajas. Para más información, consulte la página web de los CDC, [Recomendaciones sobre las vacunas contra el COVID-19 para niños y adolescentes](#).
- **Las vacunas contra el COVID-19 y otras vacunas infantiles de rutina se pueden administrar en la misma visita.**
- **Si su hijo ya tuvo el COVID-19, aún debería vacunarse.** Espere hasta que se hayan recuperado (si tenían síntomas) y terminado el aislamiento para recibir cualquier vacuna, incluida la vacuna contra el COVID-19. Si recientemente tuvo el COVID-19, puede considerar retrasar la dosis de la vacuna contra el COVID-19 (serie primaria o refuerzo) por 3 meses desde que comenzaron los síntomas o cuando dieron positivo por primera vez (si no tenían ningún síntoma).
- **Para más información,** consulte la página web de los CDC, [Vacunas contra el COVID-19 para personas con inmunodepresión moderada o grave](#).