



































































زمان‌بندی‌های واکسن‌های کووید-19 برای افرادی که دچار نقص ایمنی نیستند

همه افراد باید این دوزها را دریافت کنند				بعضی افراد ممکن است دوز تقویتی دوم دریافت کنند ¹	
سن	واکسن	سری اولیه	دوز تقویتی		
5-11	Pfizer ²	 دوز اول	  دوز دوم	در حال حاضر مجاز نیست	
12-17	Pfizer ²	 دوز اول	  دوز دوم	  فقط Pfizer	
+18	Pfizer	 دوز اول	  دوز دوم	  هرگونه واکسن کووید-19	  فقط Pfizer یا Moderna
+18	Moderna	 دوز اول	  دوز دوم	  هرگونه واکسن کووید-19	  فقط Pfizer یا Moderna
+18	Johnson & Johnson	 دوز اول		 هرگونه واکسن کووید-19	  فقط Pfizer یا Moderna

اگر به کووید-19 مبتلا هستید، برای دریافت هر یک از دوزهای واکسن کووید-19، صبر کنید تا بهبود یابید (اگر علائم بیماری دارید) و دوره انزوایان به پایان برسد. اگر به‌خازگی مبتلا بوده اید، مجازید دریافت دوز(های) تقویتی را به مدت 3 ماه به تعویق اندازید.

- اگر سن‌تان 50 سال به بالاست یا 18-49 سال دارید و برای دوز اول و همچنین دوز تقویتی واکسن J&J دریافت کردید، شما در خصوص دریافت دوز تقویتی دوم حق تصمیم‌گیری دارید. به [اندیشیدن در خصوص دریافت دوز تقویتی دوم](#) مراجعه نمایید.
- Pfizer تنها واکسن کووید-19 است که برای افراد زیر 18 سال مجوز دریافت کرده است. واکسن Pfizer برای کودکان 5-11 ساله دارای همان ماده اصلی فعال واکسن بزرگسالان است اما دوز آن کمتر است (یک سوم دوز).
- زمان‌بندی دوز دوم. برای اغلب افراد 12-64 ساله، بهترین زمان ممکن است 8 هفته باشد. 3 هفته به کسانی که 65 سال به بالا هستند یا کسانی که به محافظت فوری نیاز دارند، توصیه می‌شود. به [زمان‌بندی دوز دوم Pfizer یا Moderna](#) مراجعه نمایید.
- برای تمامی دوزها، Pfizer و Moderna بر J&J ترجیح داده می‌شوند. J&J در [برخی شرایط](#) عرضه می‌شود.

زمان‌بندی‌های واکسن‌های کووید-19 برای افرادی که دچار نقص ایمنی هستند¹

سن	واکسن	سری اولیه	دوز تقویتی	بعضی افراد ممکن است دوز تقویتی دوم دریافت کنند ²
5-11	Pfizer	 دوز اول  3 هفته  دوز دوم  حداقل 4 هفته  دوز سوم	در حال حاضر مجاز نیست	
12-17	Pfizer	 دوز اول  3 هفته  دوز دوم  حداقل 4 هفته  دوز سوم  حداقل 3 ماه  فقط Pfizer		 حداقل 4 ماه  فقط Pfizer
+18	Pfizer	 دوز اول  3 هفته  دوز دوم  حداقل 4 هفته  دوز سوم  حداقل 3 ماه  هر گونه واکسن کووید-319		 حداقل 4 ماه  فقط Pfizer یا Moderna
+18	Moderna	 دوز اول  4 هفته  دوز دوم  حداقل 4 هفته  دوز سوم  حداقل 3 ماه  هر گونه واکسن کووید-319		 حداقل 4 ماه  فقط Pfizer یا Moderna
+18	Johnson & Johnson	 دوز اول  حداقل 4 هفته  دوز دوم فقط Pfizer یا Moderna	 حداقل 2 ماه  هر گونه واکسن کووید-319	 حداقل 4 ماه  فقط Pfizer یا Moderna









اگر به کووید-19 مبتلا هستید، برای دریافت هر یک از دوزهای واکسن کووید-19، صبر کنید تا بهبود یابید (اگر علائم بیماری دارید) و دوره انزوایتنان به پایان برسد.

1. افراد 5 سال به بالا که دارای سیستم ایمنی نسبتاً یا شدیداً تضعیف شده هستند (برای مثال، سرطان‌های مربوط به خون یا درمان‌های خاصی برای سرطان، پیوند اعضا و برخی بیماری‌های خودایمنی) باید یک دوز اولیه تکمیلی دریافت کنند. اگر 12+ هستند، آنها باید یک دوز تقویتی نیز دریافت کنند.
2. افراد 12 سال به بالا از گزینه دریافت دوز تقویتی دوم برخوردار هستند. آنها باید در نظر گیرند که هر چه زودتر این دوز را دریافت کنند و با پزشک خود درباره بهترین زمان دریافت بر مبنای خطرات و طرح درمانی‌شان صحبت کنند. به اندیشیدن در خصوص دریافت دوز تقویتی دوم مراجعه نمایید.
3. برای تمامی دوزها، واکسن‌های Pfizer و Moderna بر J&J ترجیح داده واکسن می‌شوند. J&J در برخی شرایط عرضه می‌شود.

زمان‌بندی‌های واکسن کووید-19

دوز(های) تقویتی/تکمیلی برای افرادی که با یک سری واکسن در خارج از ایالات متحده، در یک کارآزمایی بالینی، یا سری که متشکل از ترکیب و انطباق واکسن‌ها بوده است کاملاً واکسینه هستند^{1,2}

افرادی که با سری واکسن کووید-19 که مورد تأیید/تصویب FDA نیست کاملاً واکسینه تلقی می‌شوند، باید برای دوزهای تقویتی و/یا تکمیلی واکسن کووید-19 از زمان بندی‌های زیر پیروی کنند.

همه افراد باید این دوزها را دریافت کنند				بعضی افراد ممکن است دوز تقویتی دوم دریافت کنند ³	
سن	واکسن	سری اولیه	دوز تقویتی		
+12	واکسنی که مورد تصویب/تأیید نیست FDA	 وقفه توصیه شده دوز اول	 حداقل 5 ماه دوز دوم	 حداقل 4 ماه 4Moderna یا Pfizer (Pfizer فقط، 12-17)	 حداقل 4 ماه 4Moderna یا Pfizer فقط برای 50+ سال ³
+12 سال دارای سیستم ایمنی ضعیف	واکسنی که مورد تصویب/تأیید نیست FDA	 وقفه توصیه شده دوز اول	 حداقل 4 هفته دوز سوم 4Moderna یا Pfizer (Pfizer فقط، 12-17)	 حداقل 3 ماه 4Moderna یا Pfizer (Pfizer فقط، 12-17)	 حداقل 4 ماه 3.4Moderna یا Pfizer (Pfizer فقط، 12-17)

توجه: اگر به‌تازگی به کووید-19 مبتلا بوده اید، مجازید دریافت دوز(های) تقویتی‌تان را به مدت 3 ماه به تعویق اندازید.

- با گذشت دو هفته از دریافت هر یک از موارد زیر شما کاملاً واکسینه تلقی می‌شوید:
 - دوز نهایی سری واکسنی که از سوی سازمان جهانی بهداشت (WHO) در فهرست استفاده اضطراری درج شده است. در حال حاضر، این واکسن‌ها عبارتند از AstraZeneca-Oxford (Vaxzevria)، انستیتوی سرم هند (Covishield و Covovax)، (Sinopharm) BIBP، (CoronaVac) Sinovac، (Bharat Biotech International) (Covaxin) و (Novavax) (Nuvaxovid). به لیست کنونی فهرست استفاده اضطراری سازمان جهانی بهداشت (WHO EUL) کووید-19 مراجعه نمایید.
 - دوز نهایی تلفیقی از «ترکیب و انطباق» واکسن‌های مورد تأیید/تصویب FDA و/یا واکسن‌های فهرست شده WHO (تنها در صورتی که 2 دوز اول دست کم 17 روز از هم فاصله داشته باشند).
 - همه واکسن‌های «فعال» کووید-19 توصیه شده (نه دارونما) در یک کارآزمایی بالینی واکسن. توجه: واکسن موردنظر باید با یک واکسن فهرست شده WHO باشد که مورد تأیید/تصویب FDA نیست یا واکسنی باشد که یک هیئت داده‌ها و نظارت ایمنی ایالات متحده یا هیئتی هم‌تراز، به‌طور مستقل اثر بخشی آن را تأیید کرده است.
 - اگر معیارهای مربوط به واکسیناسیون کامل را برآورده نمی‌سازید، به پیوست‌های A و B CDC در خصوص واکسن‌های خارج از ایالات متحده/کارآزمایی بالینی مراجعه نمایید.
 - اگر سنتان 50 سال به بالاست یا به نقص ایمنی متوسط یا شدید مبتلا هستید (سیستم ایمنی ضعیف)، شما در خصوص دریافت دوز تقویتی دوم (فقط واکسن‌های Moderna یا Pfizer) حق تصمیم‌گیری دارید. اگر 12-17 ساله هستید، فقط می‌توانید واکسن Pfizer دریافت کنید. به اندیشیدن در خصوص دریافت دوز تقویتی دوم مراجعه نمایید.
 - واکسن‌های کووید-19 Moderna و Pfizer تنها واکسن‌هایی هستند که به عنوان دوز تکمیلی یا تقویتی برای افرادی که سری اولیه واکسن کووید-19 مورد تصویب/تأیید FDA را دریافت نکردند، مجاز می‌باشند. کودکان 12-17 ساله فقط می‌توانند واکسن Pfizer دریافت کنند.
- برای کسب اطلاعات بیشتر، به بخش چه زمانی واکسن‌های کووید-19 من بروز است در صفحه وب «زمانی که واکسینه هستید» مراجعه نمایید.