

















COVID-19ワクチン接種のスケジュール























免疫不全症ではない方向け

年齢	ワクチン	すべての方が受けるべきワクチン接種		ブースター接種	2回目のブースター接種の対象となりうる方 ¹
		プライマリー接種			
5-11歳	Pfizer ²	 3週間 → 		現在、未承認	
12-17歳	Pfizer ²	 3~8週間 ³ → 	5ヶ月以上 → 	Pfizerのみ	
18歳以上	Pfizer	 3~8週間 ³ → 	5ヶ月以上 → 	いずれの COVID-19 ワクチンも可 ⁴	4ヶ月以上 →  50歳以上の方のみ ¹ PfizerまたはModernaのみ
18歳以上	Moderna	 4~8週間 ³ → 	5ヶ月以上 → 	いずれの COVID-19 ワクチンも可 ⁴	4ヶ月以上 →  50歳以上の方のみ ¹ PfizerまたはModernaのみ
18歳以上	Johnson & Johnson		5ヶ月以上 → 	いずれの COVID-19 ワクチンも可 ⁴	4ヶ月以上 →  50歳以上または18歳以上でJ&Jワクチン2回接種の場合 ¹ PfizerまたはModernaのみ

COVID-19に感染している場合は、いずれのCOVID-19ワクチンも（症状があった場合）症状が回復し、隔離が終了してから接種を受けてください。最近感染した方は、ブースター接種を3か月遅らせることを検討してください。

- 50歳以上または18~49歳の方で、1回目の接種とブースター接種の両方でJ&Jワクチンの接種を受けた場合は、2回目のブースター接種を受けることを選択できます。[2回目のブースター接種を検討中の方](#)をご覧ください。
- Pfizerワクチンは、18歳未満の人々に認可されている唯一のCOVID-19ワクチンです。5~11歳の小児向けのPfizerワクチンは、成人用ワクチンと同じ有効成分を含んでいますが、投与量は少なくなっています（1/3の投与量）。
- 2回目の接種の時期。12~64歳の多くの人にとって8週間の間隔が最適と思われる。65歳以上の方や迅速な保護が必要な方には3週間の間隔が推奨されます。[PfizerまたはModernaワクチンの2回目接種の時期](#)をご覧ください。
- すべての接種において、J&JワクチンよりもPfizerまたはModernaワクチンが推奨されています。[状況によっては](#)J&Jワクチンが提供されることがあります。

COVID-19ワクチン接種のスケジュール 免疫不全症の方向け¹

年齢	ワクチン	すべての方が受けるべきワクチン接種			ブースター接種	2回目のブースター接種の対象となりうる方 ²	
		プライマリー接種					
5-11歳	Pfizer	 3週間 →  4週間以上 → 	1回目接種	2回目接種	3回目接種	現在、未承認	
12-17歳	Pfizer	 3週間 →  4週間以上 →  3ヶ月以上 → 	1回目接種	2回目接種	3回目接種	Pfizerのみ	4ヶ月以上 →  Pfizerのみ
18歳以上	Pfizer	 3週間 →  4週間以上 →  3ヶ月以上 → 	1回目接種	2回目接種	3回目接種	いずれのCOVID-19ワクチンも可 ³	4ヶ月以上 →  PfizerまたはModernaのみ
18歳以上	Moderna	 4週間 →  4週間以上 →  3ヶ月以上 → 	1回目接種	2回目接種	3回目接種	いずれのCOVID-19ワクチンも可 ³	4ヶ月以上 →  PfizerまたはModernaのみ
18歳以上	Johnson & Johnson	 4週間以上 → 	1回目接種	2回目接種 PfizerまたはModernaのみ	2ヶ月以上 → 	いずれのCOVID-19ワクチンも可 ³	4ヶ月以上 →  PfizerまたはModernaのみ










COVID-19に感染している場合は、いずれのCOVID-19ワクチンも（症状があった場合）症状が回復し、隔離が終了してから、接種を受けてください。

1. 免疫機能が中等度または重度に低下している5歳以上の方（例：血液の癌、特定の癌治療、臓器移植、特定の自己免疫疾患など）は、追加のプライマリー接種を受ける必要があります。12歳以上の場合は、ブースター接種も受ける必要があります。
2. 12歳以上の方は、2回目のブースター接種を受けるオプションがあります。できるだけ早くこの接種を受けるかどうかを検討し、リスクと治療計画に基づく最適な接種時期について医師に相談してください。[2回目のブースター接種を検討中の方](#)をご覧ください。
3. すべての接種において、J&JワクチンよりもPfizerまたはModernaワクチンが推奨されています。[状況によっては](#)J&Jワクチンが提供されることがあります。

COVID-19ワクチン接種のスケジュール

米国外で、臨床試験または混合接種によりワクチン接種を完了^{1,2}した方向けブースター接種/追加接種

FDAが承認/認可していないCOVID-19ワクチンのプライマリー接種によりワクチン接種を完了したと見なされる人は、ブースター接種および/または追加のCOVID-19ワクチン接種について以下のスケジュールに従う必要があります。

年齢	ワクチン	すべての方が受けるべきワクチン接種			2回目のブースター接種の対象となりうる方 ³	
		プライマリー接種		ブースター接種		
12歳以上	FDAにより承認/認可されていないワクチン	 推奨されている間隔 1回目接種	 2回目接種	5ヶ月以上  PfizerまたはModerna ⁴ (12~17歳, Pfizerのみ)	4ヶ月以上  PfizerまたはModerna ⁴ 50歳以上の方のみ ³	
12歳以上で、免疫機能が低下している方	FDAにより承認/認可されていないワクチン	 推奨されている間隔 1回目接種	 2回目接種	4週間以上  3回目接種 PfizerまたはModerna ⁴ (12~17歳, Pfizerのみ)	3ヶ月以上  PfizerまたはModerna ⁴ (12~17歳, Pfizerのみ)	4ヶ月以上  PfizerまたはModerna ^{3,4} (12~17歳, Pfizerのみ)

注：最近COVID-19に感染した場合は、ブースター接種を3か月遅らせることを検討してください。

- 以下の接種を受けてから2週間後にワクチン接種完了者と見なされます。
 - 世界保健機関（WHO）によって緊急使用向けリストに記載されているワクチンの最後の接種。現在、これにはAstraZeneca-Oxford (Vaxzevria)、S Serum Institute of India Pvt. Ltd (Covishield および Covovax)、BIBP (Sinopharm)、Sinovac (CoronaVac)、Bharat Biotech International (Covaxin)、及び Novavax (Nuvaxovid)が含まれます。現在のCOVID-19 WHO EULリストを参照してください。
 - FDAが承認/認可したワクチンおよび/またはWHOのリストに記載されているワクチンの「混合接種」で最後に受けた接種（1回目と2回目の接種間隔が17日以上の場合のみ）。
 - 臨床ワクチン試験で推奨されているすべての「有効な（プラセボではない）」COVID-19ワクチン。注：ワクチンは、FDAが承認/認可していないが、WHOのリストに記載されているワクチン、または米国のデータおよび安全性監視委員会または同等の機関が独自に有効性を確認しているワクチンのいずれかである必要があります。
- ワクチン接種完了の基準を満たしていない場合は、米国/臨床試験外のCDCワクチン(付録AおよびB)を参照してください。
- 50歳以上の方、または中等度または重度の免疫不全症(免疫機能低下)の方の場合は、2回目のブースター接種（PfizerまたはModernaワクチンのみ）を選択できます。12~17歳の方の場合、Pfizerワクチンのみ接種を受けることができます。2回目のブースター接種を検討中の方をご覧ください。
- PfizerおよびModernaのCOVID-19ワクチンは、FDAが承認/認可したCOVID-19プライマリー接種を受けていない方々向けの追加接種またはブースター接種への使用が承認されている唯一のワクチンです。12~17歳の子供は、Pfizerワクチンのみ接種を受けることができます。

詳細については、「ワクチン接種後」のウェブページの「現時点で受けられるCOVID-19ワクチン接種を完了したとみなされるのはいつですか」のセクションをご覧ください。