














ГРАФИК ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19

Для людей без иммунодефицита

Возраст	Вакцина	КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ СЛЕДУЕТ ПРИВИТЬСЯ ЭТИМИ ДОЗАМИ			НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ	
		Основная серия		Стимулирующая доза	ВТОРУЮ СТИМУЛИРУЮЩУЮ ДОЗУ ¹	
5-11 лет	Pfizer ²	 Доза 1	3 недели	 Доза 2	В настоящее время не разрешена	
12-17 лет	Pfizer ²	 Доза 1	3-8 недель ³	 Доза 2	Не менее 5 месяцев	 Только Pfizer
18 лет и старше	Pfizer	 Доза 1	3-8 недель ³	 Доза 2	Не менее 5 месяцев	 Любая вакцина от COVID-19 ⁴ Только для 50 лет и старше ¹
18 лет и старше	Moderna	 Доза 1	4-8 недель ³	 Доза 2	Не менее 5 месяцев	 Любая вакцина от COVID-19 ⁴ Только для 50 лет и старше ¹
18 лет и старше	Johnson & Johnson	 Доза 1	Не менее 5 месяцев		 Любая вакцина от COVID-19 ⁴	Не менее 4 месяцев Для 50 лет и старше и 18 лет и старше с 2 дозами J&J ¹























Если вы заражены COVID-19, дождитесь выздоровления (если у вас были симптомы) и завершения изоляции для прививки любыми дозами вакцины от COVID-19. Рассмотрите возможность отложить прививку стимулирующей дозой(ами) на 3 месяца, если вы были заражены недавно.

- Если вам 50 лет или старше ИЛИ вам 18-49 лет, и вы привились вакциной J&J в качестве первой дозы И стимулирующей дозы, вы можете привиться 2-й стимулирующей дозой. См. [Информацию о получении 2й стимулирующей дозы](#).
- Вакцина Pfizer – это единственная вакцина от COVID-19, разрешенная для людей младше 18 лет. Вакцина Pfizer для детей 5-11 лет имеет те же активные компоненты, что и вакцина для взрослых, но вводится в меньшей дозе (1/3 дозы).
- Время получения 2^й дозы. Период в 8 недель может быть наилучшим для большинства людей в возрасте 12-64 лет. Период в 3 недели – рекомендованный период для людей в возрасте 65 лет и старше или людей, которые нуждаются в быстрой защите. См. [Время получения 2^й дозы вакцины Pfizer или Moderna](#).
- Вакцины Pfizer и Moderna предпочтительными вакцине J&J в отношении всех доз. Вакцина J&J предлагается в [некоторых ситуациях](#).



ГРАФИК ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19

Для людей с иммунодефицитом¹

Возраст	Вакцина	КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ СЛЕДУЕТ ПРИВИТЬСЯ ЭТИМИ ДОЗАМИ			НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ	
		Основная серия		Стимулирующая доза	ВТОРУЮ СТИМУЛИРУЮЩУЮ ДОЗУ ²	
5-11 лет	Pfizer	 Доза 1	3 недели →  Доза 2	Не менее 4 недель →  Доза 3	В настоящее время не разрешена	
12-17 лет	Pfizer	 Доза 1	3 недели →  Доза 2	Не менее 4 недель →  Доза 3	Не менее 3 месяцев →  Только Pfizer	Не менее 4 месяцев →  Только Pfizer
18 лет и старше	Pfizer	 Доза 1	3 недели →  Доза 2	Не менее 4 недель →  Доза 3	Не менее 3 месяцев →  Любая вакцина от COVID-19 ³	Не менее 4 месяцев →  Только Pfizer или Moderna
18 лет и старше	Moderna	 Доза 1	4 недели →  Доза 2	Не менее 4 недель →  Доза 3	Не менее 3 месяцев →  Любая вакцина от COVID-19 ³	Не менее 4 месяцев →  Только Pfizer или Moderna
18 лет и старше	Johnson & Johnson	 Доза 1	Не менее 4 недель →  Доза 2	Не менее 2 месяцев →  Любая вакцина от COVID-19 ³	Не менее 4 месяцев →  Только Pfizer или Moderna	

Если вы заражены COVID-19, дождитесь выздоровления (если у вас были симптомы) и завершения изоляции для прививки любыми дозами вакцины от COVID-19.










1. Людям в возрасте 5 лет и старше с [умеренно или сильно ослабленной иммунной системой](#) (например, при наличии рака крови или прохождении определенных видов лечения раковых заболеваний, при пересадке органов и в случаях определенных аутоиммунных заболеваний) следует привиться дополнительной дозой в основной серии. Если им 12 лет и больше, им также следует привиться стимулирующей дозой(ами).
2. У людей в возрасте 12 лет и старше есть возможность привиться 2^й стимулирующей дозой. Им следует рассмотреть возможность получения этой дозы в самое ближайшее время и проконсультироваться со своим врачом о наилучшем времени для ее получения на основании имеющихся рисков и плана лечения. См. [Информацию о получении 2^й стимулирующей дозы](#).
3. Вакцины Pfizer и Moderna являются предпочтительными вакцине J&J в отношении всех доз. Вакцина J&J предлагается в [некоторых ситуациях](#).



ГРАФИК ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19

Стимулирующая/дополнительная доза(ы) для людей, которые полностью вакцинированы^{1,2} за пределами США серией вакцины в рамках клинического испытания или смешанной серией вакцины

Люди, которые считаются полностью вакцинированными основной серией вакцины от COVID-19, не разрешенной/утвержденной FDA, должны следовать нижеуказанному графику при получении стимулирующей и/или дополнительной доз вакцины от COVID-19.

		КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ СЛЕДУЕТ ПРИВИТЬСЯ ЭТИМИ ДОЗАМИ				НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ВТОРУЮ СТИМУЛИРУЮЩУЮ ДОЗУ ³				
Возраст	Вакцина	Основная серия		Стимулирующая доза						
12 лет и старше	Вакцина, не разрешенная/утвержденная FDA	 Доза 1	Рекомендуемый интервал	 Доза 2	Не менее 5 месяцев	 Доза 3	Не менее 4 месяцев	 Доза 4		
						Pfizer или Moderna ⁴ (12-17 лет, только Pfizer)		Pfizer или Moderna ⁴ Только для 50 лет и старше ³		
12 лет и старше со слабой иммунной системой	Вакцина, не разрешенная/утвержденная FDA	 Доза 1	Рекомендуемый интервал	 Доза 2	Не менее 4 недель	 Доза 3	Не менее 3 месяцев	 Доза 4	Не менее 4 месяцев	 Доза 5
						Pfizer или Moderna ⁴ (12-17 лет, только Pfizer)		Pfizer или Moderna ⁴ (12-17 лет, только Pfizer)		Pfizer или Moderna ^{3,4} (12-17 лет, только Pfizer)

Примечание: если недавно вы были заражены **COVID-19**, рассмотрите возможность отложить получение стимулирующей дозы (или доз) на **3** месяца.

- Вы считаетесь полностью вакцинированными через две недели после прививки:
 - Последней дозой серией вакцины, [внесенной в список для экстренного использования](#) Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В настоящее время, это включает в себя вакцины AstraZeneca-Oxford (Vaxzevria), Serum Institute of India Pvt. Ltd (Covishield и Covovax), BIBP (Sinopharm), Sinovac (CoronaVac), Bharat Biotech International (Covaxin) и Novavax (Nuvaxovid). Ознакомьтесь с текущим [списком ВОЗ разрешенных к экстренному использованию вакцин от COVID-19](#).
 - Последней дозой «смешанной» комбинации вакцин, разрешенных/утвержденных FDA и/или вакцин, внесенных в список ВОЗ (только если первые 2 дозы были сделаны с интервалом не менее 17 дней).
 - Всеми рекомендованными «активными» вакцинами от COVID-19 (не плацебо) в клиническом испытании вакцины. Примечание: вакцина должна быть либо вакциной, внесенной в список ВОЗ, которая не одобрена/утверждена FDA, либо вакциной, для которой Совет по мониторингу данных и безопасности США или его эквивалент независимо [подтвердил ее эффективность](#).
- Если вы не отвечаете критериям полной вакцинации, ознакомьтесь с информацией CDC о вакцинах за пределами США/введенных в рамках клинического испытания, в [Приложениях А и В](#).
- Вы можете привиться 2^й стимулирующей дозой (только вакцины Pfizer или Moderna), если вам 50 лет или больше ИЛИ если вы имеете [умеренный или тяжелый иммунодефицит](#) (слабую иммунную систему). Если вам 12-17 лет, вы можете привиться только вакциной Pfizer. См. [Информацию о получении 2^й стимулирующей дозы](#).
- Вакцины Pfizer и Moderna от COVID-19 – это единственные вакцины, утвержденные в качестве дополнительной или стимулирующей дозы для людей, которые не привились основной серией вакцины от COVID-19, утвержденной/разрешенной FDA. Дети 12-17 лет могут привиться только вакциной Pfizer.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с разделом [«Когда я считаю привитым необходимыми дозами вакцины от COVID-19»](#) на веб-странице «После вашей вакцинации».

