

















COVID-19 疫苗接种时间表

适用于非免疫系统薄弱者

年龄区间	疫苗品牌	每个人都应该接种这些剂量			有些人可能需要接种第二剂加强剂 ¹	
		初始剂量		加强剂量		
5-11岁	辉瑞 ²	 第一剂	间隔3周 →  第二剂	目前没有获得授权		
12-17岁	辉瑞 ²	 第一剂	间隔3-8周 ³ →  第二剂	至少5个月 → 	仅可接种辉瑞疫苗	
18岁及以上	辉瑞	 第一剂	间隔3-8周 ³ →  第二剂	至少5个月 → 	任意一种 COVID-19 疫苗 ⁴	至少4个月 →  仅适用于50岁及以上的人士 ¹ 仅可接种辉瑞或莫德纳疫苗
18岁及以上	莫德纳	 第一剂	间隔4-8周 ³ →  第二剂	至少5个月 → 	任意一种 COVID-19 疫苗 ⁴	至少4个月 →  仅适用于50岁及以上的人士 ¹ 仅可接种辉瑞或莫德纳疫苗
18岁及以上	强生	 第一剂	至少5个月 → 	任意一种 COVID-19 疫苗 ⁴	至少4个月 →  仅适用于50岁及以上的人士以及18岁及以上且已接种两剂强生疫苗的个人 ¹ 仅可接种辉瑞或莫德纳疫苗	























如果你感染了COVID-19，需要等到你康复（如果你出现症状）并完成隔离期后再接种任何COVID-19疫苗剂量。如果你最近曾感染COVID-19，你可以考虑推迟3个月再接种加强剂。

- 如果你的年龄在50岁或以上，或在18-49岁之间且接种的第一剂和加强剂疫苗都是强生疫苗，你可以选择接种第二剂加强剂。请参阅“[考虑接种第二剂加强剂疫苗](#)”。
- 辉瑞疫苗是唯一获得授权可用于18岁以下群体的COVID-19疫苗。适用于5-11岁儿童的辉瑞疫苗的活性成分与成人接种的疫苗相同，但剂量较小（为成人剂量的1/3）。
- 接种第二剂疫苗的时间。对于大多数12-64岁的人而言，间隔8周可能是最好的。对于65岁及以上或需要更迅速的保护的个体而言，建议间隔3周。详见“[第2剂辉瑞或莫德纳疫苗的接种时间](#)”。
- 对于所有疫苗剂量而言，均应首选辉瑞和莫德纳疫苗（相较于强生疫苗）。在**某些情况下**，你可以接种强生疫苗。



COVID-19 疫苗接种时间表

适用于免疫系统薄弱者¹

年龄区间	疫苗品牌	每个人都应该接种这些剂量				加强剂量	有些人可能需要接种第二剂加强剂 ²	
		初始剂量						
5-11岁	辉瑞	 第一剂	间隔 3周 →  第二剂	至少 4周 →  第三剂		目前没有获得授权		
12-17岁	辉瑞	 第一剂	间隔 3周 →  第二剂	至少 4周 →  第三剂	至少 3个月 → 	仅可接种辉瑞疫苗	至少 4个月 → 	仅可接种辉瑞疫苗
18岁及以上	辉瑞	 第一剂	间隔 3周 →  第二剂	至少 4周 →  第三剂	至少 3个月 → 	任意一种 COVID-19 疫苗 ³	至少 4个月 → 	仅可接种辉瑞或莫德纳疫苗
18岁及以上	莫德纳	 第一剂	间隔 4周 →  第二剂	至少 4周 →  第三剂	至少 3个月 → 	任意一种 COVID-19 疫苗 ³	至少 4个月 → 	仅可接种辉瑞或莫德纳疫苗
18岁及以上	强生	 第一剂	间隔至少 4周 →  第二剂		至少 2个月 → 	任意一种 COVID-19 疫苗 ³	至少 4个月 → 	仅可接种辉瑞或莫德纳疫苗

如果你感染了COVID-19，需要等到你康复（如果你出现症状）并完成隔离期后再接种任何COVID-19疫苗剂量。










- 5岁及以上的**免疫系统中度或严重削弱**的个人（例如，有血液相关癌症或在接受某些癌症治疗，接受了器官移植以及患有某些自身免疫性疾病）应额外接种一剂初始剂量疫苗。如果个人在12岁及以上，他们也应该接种加强剂量疫苗。
- 12岁或以上的个人可以选择接种第二剂加强剂。他们应该考虑尽快接种此剂量，并与医生讨论根据他们的风险和计划何时是最佳的接种时机。请参阅“[考虑接种第二剂加强剂疫苗](#)”。
- 对于所有疫苗剂量而言，均应首选辉瑞和莫德纳疫苗（相较于强生疫苗）。在[某些情况下](#)，你可以接种强生疫苗。



COVID-19 疫苗接种时间表

在美国以外、在临床试验中或接种了混合搭配疫苗的已全剂量接种^{1,2}COVID-19疫苗系列的个人可接种的加强/额外剂量

被认为已全剂量接种非FDA批准/授权的COVID-19疫苗初始剂量的个人应遵循以下COVID-19疫苗加强剂和/或额外剂的接种时间表。

年龄区间	疫苗品牌	每个人都应该接种这些剂量				有些人可能需要接种第二剂加强剂 ³		
		初始剂量		加强剂量				
12岁及以上	非FDA授权/批准的疫苗	 第一剂	建议的间隔时间 →  第二剂	至少5个月 → 	至少4个月 → 	辉瑞或莫德纳疫苗 ⁴ (12至17岁的个人仅可接种辉瑞疫苗)	辉瑞或莫德纳疫苗 ⁴ 仅适用于50岁及以上的个人 ³	
免疫系统薄弱的12岁及以上个人	非FDA授权/批准的疫苗	 第一剂	建议的间隔时间 →  第二剂	至少4周 →  第三剂 辉瑞或莫德纳疫苗 ⁴ (12至17岁的个人仅可接种辉瑞疫苗)	至少3个月 → 	至少4个月 → 	辉瑞或莫德纳疫苗 ⁴ (12至17岁的个人仅可接种辉瑞疫苗)	辉瑞或莫德纳疫苗 ^{3,4} (12至17岁的个人仅可接种辉瑞疫苗)

注意：如果你最近曾感染COVID-19，你可以考虑推迟3个月再接种加强剂。

- 在接种以下疫苗两周后，你会被视为已全剂量接种疫苗：
 - 世界卫生组织(WHO)列为紧急使用的疫苗系列的最后一剂。目前，此类疫苗包括阿斯利康-牛津(AstraZeneca-Oxford)的疫苗(Vaxzevria)、印度血清研究所私营有限责任公司(Serum Institute of India Pvt. Ltd)的疫苗(Covishield和Covovax)、BIBP国药集团(Sinopharm)疫苗、科兴生物(Sinovac)的疫苗(CoronaVac)、巴拉特生物技术公司(Bharat Biotech International)的疫苗(Covaxin)以及Novavax的疫苗(Nuvaxovid)。请参阅当前的[COVID-19 WHO EUL 列表](#)。
 - 由FDA批准/授权和/或WHO列出的疫苗“混合搭配”的疫苗系列的最后一剂（仅在前两剂间隔至少17天的情况下）。
 - 在临床疫苗试验中，接种了所有建议的“活性”COVID-19疫苗（不是安慰剂）。注意：此类COVID-19疫苗应该是未经美国食品和药物管理局(FDA)批准/授权但由世界卫生组织列出的疫苗，或者是一个美国数据和安全监测委员会或同等机构独立证实具有有效性的疫苗。
 - 如果你不符合已全剂量接种疫苗的要求，请参阅CDC的在美国以外/临床试验中接种的疫苗[附录A和B](#)。
 - 如果你的年龄在50岁或以上，或者如果你的免疫功能中度或严重受损（免疫系统薄弱），你可以选择接种第二剂加强剂疫苗（仅可接种辉瑞或莫德纳疫苗）。如果你的年龄在12至17岁之间，你只能接种辉瑞疫苗。请参阅[“考虑接种第二剂加强剂疫苗”](#)。
 - 辉瑞和莫德纳 COVID-19疫苗是唯一获准作为未接种FDA授权/批准的COVID-19初始疫苗的个人接种的额外剂量或加强剂量的疫苗。12-17岁的儿童只能接种辉瑞疫苗。
- 欲了解更多信息，请参见网页“当你已全剂量接种疫苗后”的[“我何时可算作已满足最新的COVID-19疫苗接种要求？”](#)部分。

