

















CALENDARIOS DE VACUNAS CONTRA EL COVID-19

Para personas que no están inmunodeprimidos























Edad	Vacuna	Todos deberían recibir estas dosis			Algunas personas pueden obtener un segundo refuerzo ¹			
		Serie Primaria		Dosis de refuerzo				
5-11	Pfizer ²	 Dosis 1	3 semanas	 Dosis 2	No autorizado			
12-17	Pfizer ²	 Dosis 1	3-8 semanas ³	 Dosis 2	Al menos 5 meses	 Solo Pfizer		
18+	Pfizer	 Dosis 1	3-8 semanas ³	 Dosis 2	Al menos 5 meses	 Cualquier vacuna contra el COVID-19 ⁴	Al menos 4 meses	 Solo Pfizer o Moderna
18+	Moderna	 Dosis 1	4-8 semanas ³	 Dosis 2	Al menos 5 meses	 Cualquier vacuna contra el COVID-19 ⁴	Al menos 4 meses	 Solo Pfizer o Moderna
18+	Johnson & Johnson	 Dosis 1			Al menos 2 meses	 Cualquier vacuna contra el COVID-19 ⁴	Al menos 4 meses	 Solo Pfizer o Moderna

Si tiene COVID-19, espere hasta que se haya recuperado de su enfermedad (si tenía síntomas) y su período de aislamiento haya terminado para recibir cualquier dosis de vacuna contra el COVID-19. Puede considerar retrasar su(s) dosis(es) de refuerzo durante 3 meses si se infectó recientemente.

1. Puede recibir una segunda dosis de refuerzo si tiene 50 años o más o si tiene entre 18 y 49 años y recibió la vacuna J&J para AMBAS series primarias y el primer refuerzo. Consulte [Recibir la segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19](#).
2. La vacuna de Pfizer es la única vacuna contra el COVID-19 que está autorizada para personas menores de 18 años. La vacuna Pfizer para niños de 5 a 11 años tiene los mismos ingredientes activos que la vacuna para adultos, pero es más pequeña (1/3 de la dosis).
3. Programación de la segunda dosis. 8 semanas puede ser lo mejor para la mayoría de las personas de 12 a 64 años. Se recomiendan 3 semanas para personas mayores de 65 años o que necesitan una protección rápida. Consulte [Programación de la segunda dosis de Pfizer o Moderna](#).
4. Se prefieren las vacunas Pfizer y Moderna a la vacuna J&J para todas las dosis. Puede obtener J&J en [algunas situaciones](#).

CALENDARIOS DE VACUNAS CONTRA EL COVID-19

Para personas con sistemas inmunológicos débiles¹

Edad	Vacuna	Todos deberían recibir estas dosis				Algunas personas pueden obtener un segundo refuerzo ¹				
		Serie Primaria		Dosis de refuerzo						
5-11	Pfizer	 Dosis 1	 Dosis 2	Al menos 4 semanas	 Dosis 3	No autorizado				
12-17	Pfizer	 Dosis 1	3 semanas	 Dosis 2	Al menos 4 semanas	 Dosis 3	Al menos 3 meses	 Solo Pfizer	Al menos 4 meses	 Solo Pfizer
18+	Pfizer	 Dosis 1	3 semanas	 Dosis 2	Al menos 4 semanas	 Dosis 3	Al menos 3 meses	 Cualquier vacuna contra el COVID-19 ³	Al menos 4 meses	 Solo Pfizer o Moderna
18+	Moderna	 Dosis 1	4 semanas	 Dosis 2	Al menos 4 semanas	 Dosis 3	Al menos 3 meses	 Cualquier vacuna contra el COVID-19 ³	Al menos 4 meses	 Solo Pfizer o Moderna
18+	Johnson & Johnson	 Dosis 1	Al menos 4 semanas	 Dosis 2	Solo Pfizer o Moderna		Al menos 2 meses	 Cualquier vacuna contra el COVID-19 ³	Al menos 4 meses	 Solo Pfizer o Moderna

Si tiene COVID-19, espere hasta que se haya recuperado de su enfermedad (si tenía síntomas) y su período de aislamiento haya terminado para recibir cualquier dosis de vacuna contra el COVID-19.

- Las personas mayores de 5 años que están [moderada o gravemente inmunodeprimidas](#) (p. ej., cánceres relacionados con la sangre o ciertos tratamientos para el cáncer, trasplantes de órganos y ciertas condiciones autoinmunes) deberían recibir una dosis primaria adicional. Si es mayor de 12 años, también deberían recibir una dosis de refuerzo.
- Si tiene 12 años o más puede recibir una segunda dosis de refuerzo. Deben









considerar recibir esta dosis lo antes posible y hablar con su médico sobre el mejor momento según sus riesgos y su plan de tratamiento. Consulte [Recibir la segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19](#).

- Se prefieren las vacunas Pfizer y Moderna a la vacuna J&J para todas las dosis. Puede obtener J&J en [algunas situaciones](#).

CALENDARIOS DE VACUNAS CONTRA EL COVID-19

Dosis de refuerzo/adicionales para personas que están completamente vacunadas^{1,2} con una serie de vacunas fuera de los EE. UU., en un ensayo clínico o que fue combinada

Las personas que se consideran **completamente vacunadas** con una serie primaria de vacunas contra el COVID-19 no aprobadas/ autorizadas por la FDA deberían seguir los calendarios de vacunación a continuación para las dosis de refuerzo y/o adicionales de la vacuna contra el COVID-19.

		Todos deberían recibir estas dosis				Algunas personas pueden obtener un segundo refuerzo ³		
Edad	Vacuna	Serie Primaria		Dosis de refuerzo				
12+	Vacuna no aprobada/ autorizada por la FDA	 Dosis 1	Intervalo recomendado	 Dosis 2	Al menos 5 meses	 Pfizer o Moderna ⁴ (12-17, solo Pfizer)	Al menos 4 meses	 Pfizer o Moderna ⁴ Solo para mayores de 50 años
		 Dosis 1	Intervalo recomendado	 Dosis 2	Al menos 4 semanas	 Dosis 3 Pfizer o Moderna ⁴ (12-17, solo Pfizer)	Al menos 3 meses	 Pfizer o Moderna ⁴ (12-17, solo Pfizer)

- Se considera que está completamente vacunado dos semanas después de recibir:
 - La dosis final de una serie de vacunas que está [listada para uso de emergencia](#) por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Actualmente esta lista incluye AstraZeneca-Oxford (Vaxzevria), Serum Institute de India Pvt. Ltd (Covishield y Covovax), BIBP (Sinopharm), Sinovac (CoronaVac), Bharat Biotech Internacional (Covaxin) y Novavax (Nuvaxovid). Consulte la lista actual [de uso de emergencia \(EUL, por sus siglas en inglés\) de la OMS](#) para las vacunas contra el COVID-19.
 - La dosis final de una serie de combinación "mezclar y combinar" de vacunas aprobadas/autorizadas por la FDA y/o incluidas en la lista de la OMS (solo si las 2 primeras dosis tuvieron al menos 17 días de diferencia).
 - Todas las vacunas contra el COVID-19 "activas" recomendadas (no placebo) en un ensayo clínico de vacunas. Nota: la vacuna debería ser una vacuna incluida en la lista de la OMS que no esté aprobada/autorizada por la FDA o una vacuna para la cual una junta de monitoreo de seguridad y datos de EE. UU. o equivalente haya [confirmado de forma independiente la eficacia](#).
- Si no cumple con los criterios para estar completamente vacunado, consulte los [Apéndices A y B](#) de vacunas de los CDC fuera de los EE. UU./ensayo clínico.
- Puede recibir una segunda dosis de refuerzo (solamente Pfizer o Moderna) si tiene 50 años o si tiene un [sistema inmunitario débil](#). Si tiene entre 12 y 17 años de edad, solo puede recibir la vacuna de Pfizer.
- Las vacunas Pfizer y Moderna contra el COVID-19 son las únicas vacunas autorizadas como dosis adicional o refuerzo para personas que no recibieron una serie de vacunas primarias contra el COVID-19 autorizadas/aprobadas por la FDA. Los niños de 12 a 17 años solo pueden recibir la vacuna de Pfizer.

Para obtener más información, consulte [¿Cuándo estoy al día con mis vacunas contra el COVID-19?](#) en la página web *Una vez que esté vacunado* para obtener más información.