














































กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับผู้ที่ไม่มีการภูมิคุ้มกันบกพร่อง

อายุ	วัคซีน	วัคซีนชุดแรก	ทุกคนควรได้รับวัคซีนเหล่านี้	วัคซีนเข็มกระตุ้น	บางคนอาจต้องได้รับ วัคซีนเข็มกระตุ้นครั้งที่สอง ¹	
5-11	Pfizer ²	 เข็มที่ 1	3 สัปดาห์ 	 เข็มที่ 2	ในปัจจุบัน ยังไม่ได้รับอนุญาต	
12-17	Pfizer ²	 เข็มที่ 1	3-8 สัปดาห์ ³ 	 เข็มที่ 2	อย่างน้อย 5 เดือน 	 Pfizer เท่านั้น
18+	Pfizer	 เข็มที่ 1	3-8 สัปดาห์ ³ 	 เข็มที่ 2	อย่างน้อย 5 เดือน 	 วัคซีนโควิด-19 ใดก็ได้ ⁴
18+	Moderna	 เข็มที่ 1	4-8 สัปดาห์ ³ 	 เข็มที่ 2	อย่างน้อย 5 เดือน 	 วัคซีนโควิด-19 ใดก็ได้ ⁴
18+	Johnson & Johnson	 เข็มที่ 1	อย่างน้อย 5 เดือน 	 วัคซีนโควิด-19 ใดก็ได้ ⁴	อย่างน้อย 4 เดือน 	 สำหรับอายุ 50+ และ สำหรับอายุ 18+ ที่ได้รับ วัคซีน J&J สองเข็ม ¹

หากคุณติดเชื้อโควิด-19 โปรดรอจนกว่าคุณจะหายจากการป่วย (หากคุณมีอาการ) และสิ้นสุดระยะเวลาการแยกตัวก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ใด ๆ และคุณอาจต้องชะลอการเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นใด ๆ ออกไปเป็นเวลา 3 เดือน หากคุณเพิ่งได้รับการติดเชื้อ

- หากคุณมีอายุ 50 ปีขึ้นไปหรือคุณมีอายุ 18-49 ปี และคุณได้รับวัคซีน J&J สำหรับการฉีดวัคซีนเข็มแรกและวัคซีนเข็มกระตุ้น 3. ระยะเวลาของการฉีดเข็มที่ 2 สำหรับคนส่วนใหญ่ที่มีอายุ 12-64 ปี ควรห่างกัน 8 สัปดาห์ และสำหรับผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปหรือคุณอาจเลือกปรับวัคซีนกระตุ้นครั้งที่ 2 โปรดดูที่ [พิจารณาเกี่ยวกับการได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นครั้งที่ 2](#) ต้องการการป้องกันอย่างเร่งด่วนควรห่างกัน 3 สัปดาห์ โปรดดูที่ [ระยะเวลาของการฉีด Pfizer หรือ Moderna เข็มที่ 2](#)
 - วัคซีน Pfizer เป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดเดียวที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี วัคซีน Pfizer สำหรับเด็กที่มี 4. สำหรับการฉีดวัคซีนทุกชนิด แนะนำวัคซีน Pfizer และ Moderna มากกว่าวัคซีน J&J คุณอาจเลือกใช้วัคซีน J&J ในบางกรณี
- อายุ 5-11 ปี มีส่วนประกอบออกฤทธิ์เหมือนกับวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ แต่มีขนาดที่น้อยกว่า (หนึ่งในสามของขนาด)

กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง¹

อายุ	วัคซีน	ทุกคนควรได้รับวัคซีนเหล่านี้				วัคซีนเข็มกระตุ้น	บางคนอาจต้องได้รับ วัคซีนเข็มกระตุ้นครั้งที่สอง ²			
		วัคซีนชุดแรก								
5-11	Pfizer	 เข็มที่ 1	3 สัปดาห์	 เข็มที่ 2	อย่างน้อย 4 สัปดาห์	 เข็มที่ 3	ในปัจจุบัน ยังไม่ได้รับอนุญาต			
12-17	Pfizer	 เข็มที่ 1	3 สัปดาห์	 เข็มที่ 2	อย่างน้อย 4 สัปดาห์	 เข็มที่ 3	อย่างน้อย 3 เดือน	 Pfizer เท่านั้น	อย่างน้อย 4 เดือน	 Pfizer เท่านั้น
18+	Pfizer	 เข็มที่ 1	3 สัปดาห์	 เข็มที่ 2	อย่างน้อย 4 สัปดาห์	 เข็มที่ 3	อย่างน้อย 3 เดือน	 วัคซีนโควิด-19 ใดก็ได้ ³	อย่างน้อย 4 เดือน	 Pfizer หรือ Moderna เท่านั้น
18+	Moderna	 เข็มที่ 1	4 สัปดาห์	 เข็มที่ 2	อย่างน้อย 4 สัปดาห์	 เข็มที่ 3	อย่างน้อย 3 เดือน	 วัคซีนโควิด-19 ใดก็ได้ ³	อย่างน้อย 4 เดือน	 Pfizer หรือ Moderna เท่านั้น
18+	Johnson & Johnson	 เข็มที่ 1	อย่างน้อย 4 สัปดาห์	 เข็มที่ 2	Pfizer หรือ Moderna เท่านั้น		อย่างน้อย 2 เดือน	 วัคซีนโควิด-19 ใดก็ได้ ³	อย่างน้อย 4 เดือน	 Pfizer หรือ Moderna เท่านั้น

















หากคุณติดเชื้อโควิด-19 โปรดรอจนกว่าคุณจะหายจากอาการป่วย (หากคุณมีอาการ) และสิ้นสุดระยะเวลาการแยกตัวก่อนเข้ารับการจัดวัคซีนโควิด-19 ใด ๆ

- ผู้ที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป **ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอในระดับปานกลางหรือรุนแรง** (เช่น มะเร็งที่เกี่ยวข้องกับระบบเลือด หรือ การรักษามะเร็งบางชนิด, การปลูกถ่ายอวัยวะ, ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง) ควรได้รับวัคซีนชุดแรกเพิ่มเติม หากมีอายุ 12 ปีขึ้นไปควรได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วย
- ผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปสามารถเลือกรับวัคซีนเข็มกระตุ้นครั้งที่ 2 และควรพิจารณาการรับวัคซีนนี้โดยเร็วที่สุด คุณควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับช่วงเวลาที่ดีที่สุดโดยพิจารณาจากความเสี่ยงและแผนการรักษาปัจจุบันของคุณ โปรดดูที่ [พิจารณาเกี่ยวกับการได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นครั้งที่ 2](#)
- สำหรับการฉีดวัคซีนทุกครั้ง แนะนำวัคซีน Pfizer และวัคซีน Moderna มากกว่าวัคซีน J&J โดยคุณอาจเลือกใช้วัคซีน J&J ในบางกรณี

กำหนดการวัคซีนป้องกันโควิด-19

เข็มกระตุ้น/เข็มเสริมสำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว^{1,2} โดยได้รับการฉีดวัคซีนจากนอกสหรัฐอเมริกา, จากการทดลองทางคลินิก, หรือได้รับวัคซีนสูตรผสมหรือการจับคู่วัคซีน

ผู้ที่ได้รับการพิจารณาว่าได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว โดยวัคซีนชุดแรกที่ได้รับนั้นเป็นวัคซีนที่ไม่ได้รับการอนุญาต/ไม่ผ่านการอนุมัติจากองค์การอาหารและยา ควรปฏิบัติตามกำหนดการด้านล่างสำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นและ/หรือวัคซีนเข็มเสริม

อายุ	วัคซีน	ทุกคนควรได้รับวัคซีนเหล่านี้				บางคนอาจต้องได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นครั้งที่สอง ³	
		วัคซีนชุดแรก		วัคซีนเข็มกระตุ้น			
12+	วัคซีนที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ผ่านการอนุมัติจากองค์การอาหารและยา	 เข็มที่ 1	ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม 	 เข็มที่ 2	อย่างน้อย 5 เดือน 	 Pfizer หรือ Moderna ⁴ (12-17, Pfizer เท่านั้น)	อย่างน้อย 4 เดือน   Pfizer หรือ Moderna ⁴ สำหรับอายุ 50+ เท่านั้น ³
12+ ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ	วัคซีนที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ผ่านการอนุมัติจากองค์การอาหารและยา	 เข็มที่ 1	ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม 	 เข็มที่ 2	อย่างน้อย 4 สัปดาห์   เข็มที่ 3 Pfizer หรือ Moderna ⁴ (12-17, Pfizer เท่านั้น)	อย่างน้อย 3 เดือน   Pfizer หรือ Moderna ⁴ (12-17, Pfizer เท่านั้น)	อย่างน้อย 4 เดือน   Pfizer หรือ Moderna ^{3,4} (12-17, Pfizer เท่านั้น)

หมายเหตุ: หากคุณเพิ่งติดเชื้อโควิด-19 คุณอาจต้องชะลอการเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นใด ๆ ออกไปเป็นระยะเวลา 3 เดือน

- คุณจะถูกถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว เมื่อครบสองสัปดาห์หลังจากได้รับ:
 - การฉีดวัคซีนเข็มสุดท้ายของชุดวัคซีนที่**ระบุไว้สำหรับการใช้ในกรณีฉุกเฉิน**โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ในปัจจุบันมีวัคซีนที่ระบุไว้หลายชนิด รวมถึง AstraZeneca-Oxford (Vaxzevria), Serum Institute of India Pvt. Ltd (Covishield and Covovax), BIBP (Sinopharm), Sinovac (CoronaVac), Bharat Biotech International (Covaxin) และ Novavax (Nuvaxovid) โปรดดูที่[รายชื่อวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับการรองรับแบบ EUL ของ WHO](#) ในปัจจุบัน
 - การฉีดวัคซีนสูตรผสมหรือการจับคู่วัคซีน "mix-and-match" ของวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจากองค์การอาหารและยา และ/หรือ ได้รับการรองรับจาก WHO (เฉพาะในกรณีที่ได้รับการฉีดวัคซีน 2 เข็มแรกห่างกันอย่างน้อย 17 วันเท่านั้น)
 - การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ "ออกฤทธิ์" ทั้งหมด (ไม่ใช่ยาหลอก) ในการทดลองทางคลินิก หมายเหตุ: ควรเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก WHO แต่ไม่ได้รับอนุญาต/ไม่ผ่านการอนุมัติจากองค์การอาหารและยา หรือวัคซีนที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและความปลอดภัยของสหรัฐอเมริกาหรือองค์การอิสระที่เทียบเท่า**ยืนยันประสิทธิภาพ**
 - หากคุณไม่ผ่านเกณฑ์สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว โปรดดูที่วัคซีน CDC นอกสหรัฐอเมริกา/การทดลองทางคลินิก [ภาคผนวก A และ B](#)
 - คุณอาจเลือกรับวัคซีนเข็มกระตุ้นครั้งที่ 2 (วัคซีน Pfizer หรือ Moderna เท่านั้น) หากคุณมีอายุ 50 ปีขึ้นไป หรือ หากคุณเป็นผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอในระดับปานกลางหรือรุนแรง (ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ) หากคุณมีอายุ 12-17 ปี คุณจะได้รับวัคซีน Pfizer เท่านั้น โปรดดูที่ [พิจารณาเกี่ยวกับการได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นครั้งที่ 2](#)
 - วัคซีน Pfizer และวัคซีน Moderna เท่านั้นที่เป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือวัคซีนเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดชุดแรกที่เป็นวัคซีนที่ได้รับการอนุญาต/ผ่านการอนุมัติจากองค์การอาหารและยา โดยเด็กอายุ 12-17 ปี สามารถรับวัคซีน Pfizer ได้เท่านั้น
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วน [ฉันต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ของฉันเมื่อใด](#) บนหน้าเว็บเมื่อคุณได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม