


















CALENDARIOS DE VACUNAS CONTRA EL COVID-19

(Si tiene una sistema inmunitario debilitado, consulte *Para personas con sistemas inmunológicos débiles*)
























Edad	Vacuna	Serie Primaria		Dosis de refuerzo #1	Dosis de refuerzo #2 ¹
5-11	Pfizer ²	 Dosis 1	3 semanas →  Dosis 2	Al menos 5 meses →  Solo Pfizer	
12-17	Pfizer ²	 Dosis 1	3-8 semanas ³ →  Dosis 2	Al menos 5 meses →  Solo Pfizer	
18+	Pfizer	 Dosis 1	3-8 semanas ³ →  Dosis 2	Al menos 5 meses →  Cualquier vacuna contra el COVID-19 ⁴	Al menos 4 meses →  Solo Pfizer o Moderna
18+	Moderna	 Dosis 1	4-8 semanas ³ →  Dosis 2	Al menos 5 meses →  Cualquier vacuna contra el COVID-19 ⁴	Al menos 4 meses →  Solo Pfizer o Moderna
18+	Johnson & Johnson	 Dosis 1	Al menos 2 meses →	 Cualquier vacuna contra el COVID-19 ⁴	Al menos 4 meses →  Solo Pfizer o Moderna

Si tiene COVID-19, espere hasta que se haya recuperado de su enfermedad (si tenía síntomas) y su período de aislamiento haya terminado para recibir cualquier dosis de vacuna contra el COVID-19. Puede considerar retrasar su(s) dosis(es) de refuerzo durante 3 meses si se infectó recientemente.

- Se recomienda una **2ª dosis de refuerzo** si tiene 50 años o más. Si tiene entre 18 y 3.49 años y recibió dos dosis de la vacuna J&J, puede recibir una segunda dosis de refuerzo. Consulte [Cómo recibir una segunda dosis de refuerzo](#).
- La vacuna de Pfizer es la única vacuna contra el COVID-19 que está autorizada para personas menores de 18 años. La vacuna Pfizer para niños de 5 a 11 años tiene los mismos ingredientes activos que la vacuna para adultos, pero es más pequeña (1/3 de la dosis).
- Programación de la segunda dosis. 8 semanas para la mayoría de las personas de 12 a 64 años. Se recomiendan 3 semanas para personas mayores de 65 años o que necesitan una protección rápida. Consulte [Programación de la segunda dosis de Pfizer o Moderna](#).
- Se recomienda las vacunas Pfizer y Moderna a la vacuna J&J para todas las dosis. Puede obtener J&J en [algunas situaciones](#).

CALENDARIOS DE VACUNAS CONTRA EL COVID-19

Para personas con sistemas inmunológicos débiles¹

Edad	Vacuna	Serie Primaria			Dosis de refuerzo #1	Dosis de refuerzo #2
5-11	Pfizer	 Dosis 1	 Dosis 2	Al menos 4 semanas →  Dosis 3	Al menos 3 meses →  Solo Pfizer	
12-17	Pfizer	 Dosis 1	3 semanas →  Dosis 2	Al menos 4 semanas →  Dosis 3	Al menos 3 meses →  Solo Pfizer	Al menos 4 meses →  Solo Pfizer
18+	Pfizer	 Dosis 1	3 semanas →  Dosis 2	Al menos 4 semanas →  Dosis 3	Al menos 3 meses →  Cualquier vacuna contra el COVID-19 ²	Al menos 4 meses →  Solo Pfizer o Moderna
18+	Moderna	 Dosis 1	4 semanas →  Dosis 2	Al menos 4 semanas →  Dosis 3	Al menos 3 meses →  Cualquier vacuna contra el COVID-19 ²	Al menos 4 meses →  Solo Pfizer o Moderna
18+	Johnson & Johnson	 Dosis 1	Al menos 4 semanas →  Dosis 2		Al menos 2 meses →  Cualquier vacuna contra el COVID-19 ²	Al menos 4 meses →  Solo Pfizer o Moderna










Si tiene COVID-19, espere hasta que se haya recuperado de su enfermedad (si tenía síntomas) y su período de aislamiento haya terminado para recibir cualquier dosis de vacuna contra el COVID-19.

- Si tiene un [moderada o gravemente inmunodeprimidas](#) (p. ej., cánceres relacionados con la sangre o ciertos tratamientos para el cáncer, trasplantes de órganos y ciertas condiciones autoinmunes) es posible que no desarrolle suficiente protección con el calendario de vacunación estándar. Se recomiendan dosis adicionales de la vacuna COVID-19. Hable con su médico sobre el mejor momento de las dosis según sus riesgos y plan de tratamiento.
- Se prefieren las vacunas Pfizer y Moderna a la vacuna J&J para todas las dosis. Puede obtener J&J en [algunas situaciones](#).

CALENDARIOS DE VACUNAS CONTRA EL COVID-19

Dosis de refuerzo/adicionales para personas que están completamente vacunadas^{1,2} con una serie de vacunas fuera de los EE. UU., en un ensayo clínico o que fue combinada

Las personas que se consideran **completamente vacunadas** con una serie primaria de vacunas contra el COVID-19 no aprobadas/autorizadas por la FDA deberían seguir los calendarios de vacunación a continuación para las dosis de refuerzo y/o adicionales de la vacuna contra el COVID-19.

Edad	Vacuna	Serie Primaria		Dosis de refuerzo #1	Dosis de refuerzo #2 ³	
12+	Vacuna no aprobada/autorizada por la FDA	 Dosis 1	Intervalo recomendado →  Dosis 2	Al menos 5 meses →  Pfizer o Moderna ⁴ (12-17, solo Pfizer)	Al menos 4 meses →  Pfizer o Moderna ⁴ Solo edades 50+	
12+ con sistemas inmuno-lógicos débiles	Vacuna no aprobada/autorizada por la FDA	 Dosis 1	Intervalo recomendado →  Dosis 2	Al menos 4 semanas →  Dosis 3 Pfizer o Moderna ⁴ (12-17, solo Pfizer)	Al menos 3 meses →  Pfizer o Moderna ⁴ (12-17, solo Pfizer)	Al menos 4 meses →  Pfizer o Moderna ⁴ (12-17, solo Pfizer)

- Se considera que está completamente vacunado dos semanas después de recibir:
 - La dosis final de una serie de vacunas que está [listada para uso de emergencia](#) por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Actualmente esta lista incluye AstraZeneca-Oxford (Vaxzevria), Serum Institute de India Pvt. Ltd (Covishield y Covovax), BIBP (Sinopharm), Sinovac (CoronaVac), Bharat Biotech Internacional (Covaxin) y Novavax (Nuvaxovid). Consulte la lista actual [de uso de emergencia \(EUL, por sus siglas en inglés\) de la OMS](#) para las vacunas contra el COVID-19.
 - La dosis final de una serie de combinación "mezclar y combinar" de vacunas aprobadas/autorizadas por la FDA y/o incluidas en la lista de la OMS (solo si las 2 primeras dosis tuvieron al menos 17 días de diferencia).
 - Todas las vacunas contra el COVID-19 "activas" recomendadas (no placebo) en un ensayo clínico de vacunas. Nota: la vacuna debería ser una vacuna incluida en la lista de la OMS que no esté aprobada/autorizada por la FDA o una vacuna para la cual una junta de monitoreo de seguridad y datos de EE. UU. o equivalente haya [confirmado de forma independiente la eficacia](#).
 - Si no cumple con los criterios para estar completamente vacunado, consulte los [Apéndices A y B](#) de vacunas de los CDC fuera de los EE. UU./ensayo clínico.
 - Se recomienda una segunda dosis de refuerzo (solamente Pfizer o Moderna) si tiene 50 años o si tiene un [sistema inmunitario débil](#). Si tiene entre 12 y 17 años de edad, solo puede recibir la vacuna de Pfizer. Consulte [Cómo recibir una segunda dosis de refuerzo](#).
 - Las vacunas Pfizer y Moderna contra el COVID-19 son las únicas vacunas autorizadas como dosis adicional o refuerzo para personas que no recibieron una serie de vacunas primarias contra el COVID-19 autorizadas/aprobadas por la FDA. Los niños de 12 a 17 años solo pueden recibir la vacuna de Pfizer.
- Para obtener más información, consulte [Mantenga sus vacunas contra el COVID-19 al día](#).