



مجموعه اولیه: Johnson & Johnson (J&J)

همه افرادی که یک دوز واکسن Johnson and Johnson (J&J) دریافت کردند باید یک دوز تقویتی دریافت کنند. این شامل افراد دارای سیستم ایمنی نسبتاً یا شدیداً تضعیف شده می‌شود. دوز تقویتی می‌تواند هر یک از واکسن‌های کووید-19 باشد (Pfizer، Moderna، J&J). اگر در مورد خطرات و مزایای تقویتی یا اینکه چه واکسنی را به عنوان تقویتی دریافت کنید سوالاتی دارید؛ با پزشکتان صحبت کنید.



مجموعه اولیه: Moderna یا Pfizer

دوزهای تقویتی برای افرادی است که Moderna یا Pfizer را به عنوان مجموعه 2 دوزی اولیه خود دریافت کردند و شرایط خاصی دارند. دوز تقویتی می‌تواند هر یک از واکسن‌های کووید-19 باشد (Pfizer، Moderna، J&J). اگر در مورد خطرات و مزایای تقویتی، اینکه آیا تقویتی مناسب شماست، یا چه واکسنی را به عنوان تقویتی دریافت کنید سوالاتی دارید، با پزشکتان صحبت کنید.

افرادی که باید یک دوز تقویتی دریافت کنند::

- ✓ افراد 65 سال به بالا
- ✓ افراد 18 سال به بالا که در محیط‌های مراقبتی طولانی مدت ساکن هستند
- ✓ افراد 50-64 سال که به بیماری‌های زمینه‌ای پزشکی مبتلا هستند

افرادی که مجازند یک دوز تقویتی دریافت کنند:

- افراد 18-49 سال مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای پزشکی
- افراد 64-18 سال که به دلیل محیط کاری یا سازمانی خود، بیشتر در معرض خطر مواجهه با کووید-19 قرار دارند

افرادی دارای سیستم ایمنی نسبتاً یا شدیداً تضعیف شده می‌توانند 6 ماه پس از دوز (سوم) تکمیلی خود، یک دوز تقویتی دریافت کنند. به «دوزهایی برای افرادی که دچار نقص ایمنی هستند» مراجعه کنید.

Pfizer



Moderna

