



プライマリー接種： ジョンソン & ジョンソン(J&J)

すべてのジョンソン&ジョンソン (J&J) ワクチンの単回接種を受けた方は、ブースター接種を受けてください。これには、免疫機能が中程度または重度に低下している方が含まれます。ブースター接種では、どのCOVID-19ワクチン (J&J、ファイザー、またはモデルナ) の接種も可能です。ブースター接種のリスクと利点、またはどのワクチンをブースター接種で受けるかについて質問がある場合は、医師にご相談ください。

1回目接種



2か月以上

ブースター接種



J&Jプライマリー接種

どのCOVID-19ワクチンも可

プライマリー接種： ファイザーまたはモデルナ

ブースター接種は、特定の条件を満たす最初の2回のワクチン接種で、ファイザーまたはモデルナ製ワクチンの接種を受けた方々を対象としています。ブースター接種では、どのCOVID-19ワクチン (J&J、ファイザー、またはモデルナ) の接種も可能です。ブースター接種のリスクと利点、自分に適しているかどうか、またはどのワクチンをブースター接種で受けるかについて質問がある場合は、医師にご相談ください。

ブースター接種を受けるべき方たち

- ✓ 65歳以上
- ✓ 18歳以上で、介護施設に居住している。
- ✓ 50～64歳で、[基礎疾患](#)がある

以下に該当する方はブースター接種を受けることができます。

- 18～49歳で、[基礎疾患](#)がある。
- 18-64歳で、職業的または組織的な環境によりウイルスへの曝露のリスクが高い。

免疫機能が中程度または重度に低下している方は、追加 (3回目) 接種の6か月後にブースター接種を受けることができます。「[免疫不全症の方向けの接種](#)」をご覧ください。

ファイザー

1回目接種



21日間

2回目接種



6か月以上

ブースター接種



ファイザーのプライマリー接種

どのCOVID-19ワクチンも可

モデルナ

1回目接種



28日間

2回目接種



6か月以上

ブースター接種



モデルナのプライマリー接種

どのCOVID-19ワクチンも可