



### أول جرعتي لقاح كانت إما من فايزر Moderna أو مودرنا

يُوصى بشدة بجرعة إضافية (ثالثة) من لقاح mRNA للأشخاص من عمر 12 عاماً فما فوق والذين يعانون من أنظمة مناعية ضعيفة بشكل معتدل أو شديد (على سبيل المثال، السرطانات المتصلة بالدم أو علاجات معينة للسرطان، وعمليات زرع الأعضاء، وشروط معينة للمناعة الذاتية).

يجب أن تكون هذه الجرعة الثالثة من نفس سلسلة لقاحات كوفيد-19 التي تلقيت منها اللقاح أول مرة. تحدث إلى طبيبك عن الحاجة إلى الحصول على جرعة إضافية من لقاح كوفيد-19 وعن أفضل توقيت بما يتسق مع خطة علاجك الحالية. هذا أمر مهم بشكل خاص إذا كنت على وشك البدء أو إعادة تناول العلاج المناعي.

ويُنصح بشدة بأخذ جرعة معززة بعد 6 أشهر على الأقل من تلقي الجرعة الإضافية (الثالثة) والتي قد تكون أي لقاح متوفر لكوفيد-19.

#### Pfizer فايزر – يجب أن تكون الجرعة الإضافية من Pfizer فايزر




#### Moderna موديرنا – يجب أن تكون الجرعة الإضافية من Moderna موديرنا



#### كانت السلسلة الأولية من جونسون & جونسون (J&J) كانت السلسلة الأولية من جونسون & جونسون (J&J)

يوصي بشدة مركز السيطرة على الأمراض بأن يتلقى الأشخاص الذين يعانون من نقص مناعة معتدل إلى شديد، والذين كانوا قد تلقوا أول جرعة من J&J، جرعة معززة. تحدث إلى طبيبك عن أفضل توقيت بناء على خطة العلاج الحالية. وهذا مهم بشكل خاص إذا كنت على وشك البدء أو إعادة تناول العلاج المناعي.



إذا كانت سلسلة اللقاح الأولية الخاصة بكم مدرجة في قائمة منظمة الصحة العالمية أو لقاح من تجربة سريرية إذا كنت بعمر 12 عاماً أو أكثر، ويُنظر إليك أنك تلقيت اللقاح بالكامل في الولايات المتحدة ولديك نظام مناعة معتدل إلى شديد الضعف، يوصى بشدة أن تحصل على جرعة إضافية من لقاح كوفيد-19 من فايزر. وينبغي تلقيها بعد 28 يوماً على الأقل من إتمام سلسلتكم الأولية.

تحدث إلى طبيبك عن الحاجة إلى الحصول على جرعة إضافية من لقاح كوفيد-19 وعن أفضل توقيت بناء على خطة علاجك الحالية. وهذا أمر مهم بشكل خاص إذا كنت على وشك البدء أو إعادة تشغيل العلاج المناعي. ويوصى بجرعة معززة بعد 6 أشهر على الأقل من تلقي الجرعة الإضافية (الثالثة). ولقاح كوفيد-19 من فايزر هو اللقاح الوحيد المصرح به كجرعة إضافية أو معززة للأشخاص الذين لم يتلقوا سلسلة لقاحات كوفيد-19 المصرح بها/المعتمدة من الهيئة.