



أول جرعتي لقاح كانت إما من Moderna أو Pfizer

يُوصى بجرعة إضافية (ثالثة) من لقاح mRNA للأشخاص الذين يعانون من أنظمة مناعية ضعيفة بشكل معتدل أو شديد.

يوصي مركز السيطرة على الأمراض بأن يتلقى الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة المتوسط إلى الشديد، والذين تلقوا بدايةً جرعتين إما من Pfizer فايزر أو Moderna موديرنا، بتلقي جرعة ثالثة. يشمل ذلك الأشخاص الذين ينتمون إلى الفئات التالية:

- تلقوا علاجًا نشطًا للسرطان لأورام أو سرطانات الدم
- تلقوا عملية زرع أعضاء وتناولوا دواء كبح جهاز المناعة
- تلقوا عملية زرع خلايا جذعية خلال السنتين الماضيتين أو يتناولون أدوية لكبح جهاز المناعة
- يعانون من نقص المناعة الأولية المعتدل أو الحاد (مثل متلازمة ديجورج، متلازمة ويسكوت - ألدريتش)
- مصابون وفي مرحلة متقدمة أو غير معالجة بفيروس نقص المناعة البشرية
- يتلقون علاجًا مستمرًا من كورتيكوستيرويدات عالية الجرعات أو عقاقير أخرى قد تكبح الاستجابة المناعية

يجب أن تكون هذه الجرعة الثالثة من نفس سلسلة اللقاحات التي تلقيت منها أول جرعتي لقاح. تحدث إلى طبيبك عن الحاجة إلى الحصول على جرعة إضافية من لقاح كوفيد-19 وعن أفضل توقيت بما يتسق مع خطة علاجك الحالية. هذا أمر مهم بشكل خاص إذا كنت على وشك البدء أو إعادة تناول العلاج المناعي.

ويمكن النظر في أخذ جرعة معززة بعد 6 أشهر على الأقل من تلقي الجرعة الإضافية (الثالثة) والتي قد تكون أي لقاح

متوفر لكوفيد-19

Pfizer فايزر – يجب أن تكون الجرعة الإضافية من Pfizer فايزر



Moderna موديرنا – يجب أن تكون الجرعة الإضافية من Moderna



كانت السلسلة الأولية من جونسون & جونسون (J&J) Johnson & Johnson

يوصي مركز السيطرة على الأمراض بأن يتلقى الأشخاص الذين يعانون من نقص مناعة معتدل إلى شديد، والذين كانوا قد تلقوا أول جرعة من J&J، جرعة معززة. تحدث إلى طبيبك عن أفضل توقيت بناء على خطة العلاج الحالية. وهذا مهم بشكل خاص إذا كنت على وشك البدء أو إعادة تناول العلاج المناعي.

