



## مجموعه اولیه Pfizer یا Moderna بود

دوز (سوم) تکمیلی واکسن mRNA به افراد دارای سیستم ایمنی نسبتاً یا شدیداً تضعیف شده توصیه می‌شود.

CDC توصیه می‌کند افراد دچار نقص ایمنی متوسط تا شدید که سری اولیه آنان Pfizer یا Moderna بوده، دوز سوم را دریافت کنند. این شامل افرادی است که:

- تحت معالجه سرطان فعال تومورها یا سرطان‌های خون قرار دارند
- پیوند عضو دریافت کرده‌اند و برای سرکوب سیستم ایمنی بدن خود دارو مصرف می‌کنند
- طی 2 سال گذشته پیوند سلول بنیادی دریافت کرده‌اند یا برای سرکوب سیستم ایمنی دارو مصرف می‌کنند
- مراحل اولیه نقص ایمنی متوسط یا شدید (مانند سندرم دی جرج، سندرم ویسکوت-آلدریچ)
- عفونت HIV پیشرفته یا درمان‌نشده
- درمان فعال با دوز بالای کورتیکواستروئید یا داروهای دیگری که ممکن است واکنش ایمنی را سرکوب کنند

این دوز سوم تکمیلی باید از نوع همان واکسن کووید-19 مجموعه اولیه شما باشد. در مورد لزوم دریافت یک دوز تکمیلی واکسن کووید-19 و بهترین زمان بندی دریافت آن بر اساس طرح درمانی فعلی خود، با پزشکتان صحبت کنید. این موضوع به‌ویژه زمانی که در شرف آغاز یا شروع مجدد درمان سرکوب سیستم ایمنی هستید، اهمیت می‌یابد.

حداقل 6 ماه پس از دریافت دوز (سوم) تکمیلی، یک دوز تقویتی را می‌توان در نظر گرفت و می‌تواند هر یک از واکسن‌های کووید-19 باشد.

### Pfizer – دوز تکمیلی باید Pfizer باشد



### Moderna – دوز تکمیلی باید Moderna باشد



## مجموعه اولیه Johnson & Johnson (J&J) بود

CDC توصیه می‌کند افراد دچار نقص ایمنی متوسط تا شدید که سری اولیه آنان J&J بوده، یک دوز تقویتی دریافت کنند. درباره بهترین زمان بندی بر مبنای طرح درمان کنونی خود، با پزشکتان صحبت کنید. این موضوع به‌ویژه زمانی که در شرف آغاز یا شروع مجدد درمان سرکوب سیستم ایمنی هستید، اهمیت می‌یابد.

