



VACUNA CONTRA EL COVID-19

Dosis para personas inmunodeprimidas


La serie primaria fue Pfizer o Moderna

Es muy recomendable que todas las personas mayores de 12 años que tienen un [sistema inmunológico de moderado a gravemente debilitado](#) (por ejemplo, cánceres relacionados con la sangre o ciertos tratamientos para el cáncer, trasplantes de órganos y ciertas afecciones autoinmunes) **reciban una dosis adicional (3ª) de la vacuna de ARNm.**

Esta tercera dosis debe ser la **misma vacuna contra el COVID-19** que su serie primaria. Hable con su médico sobre si necesita recibir una dosis adicional de la vacuna contra el COVID-19 y sobre el mejor momento basado en su plan de tratamiento actual. Esto es especialmente importante si está a punto de iniciar o reiniciar el tratamiento inmunosupresor.

Es muy recomendable una dosis de refuerzo al menos 6 meses después de recibir la (tercera) dosis adicional y puede ser cualquier vacuna contra el COVID-19.

Pfizer – La dosis adicional debería ser Pfizer




Moderna – La dosis adicional debería ser Moderna



La serie primaria fue Johnson & Johnson (J&J)

Es muy recomendable que todas las personas que tienen un sistema inmunológico moderado o gravemente debilitado cuya serie primaria fue J&J reciban una dosis de refuerzo. Hable con su médico sobre el mejor momento basado en su plan de tratamiento actual. Esto es especialmente importante si está a punto de iniciar o reiniciar el tratamiento inmunosupresor.



Si su serie primaria fue una vacuna incluida en la lista de la OMS o una vacuna de un ensayo clínico

Si tiene 12 años o más y se considera que está [completamente vacunado en los EE. UU.](#) y tiene un [sistema inmunológico de moderado a gravemente debilitado](#), es muy recomendable que reciba una dosis adicional de la **vacuna Pfizer contra el COVID-19**. Debería recibir la dosis adicional al menos 28 días después de completar su serie primaria.

Hable con su médico sobre si necesita recibir una dosis adicional de la vacuna contra el COVID-19 y sobre el mejor momento basado en su plan de tratamiento actual. Esto es especialmente importante si está a punto de iniciar o reiniciar el tratamiento inmunosupresor. *Se recomienda una dosis de refuerzo al menos 6 meses después de recibir la dosis adicional (3ª).* **La vacuna Pfizer contra el COVID-19 es la única vacuna autorizada como dosis adicional o refuerzo para personas que no recibieron una serie de vacunas contra el COVID-19 autorizada/aprobada por la FDA.**