



接種的疫苗原始劑量為輝瑞或莫德納疫苗

對於免疫系統中度或嚴重削弱的個人，建議接種額外（第三）劑 mRNA 疫苗。

美國疾病控制與預防中心(CDC)建議，有中度至重度免疫功能受損且已接種mRNA疫苗（輝瑞或莫德納疫苗）原始劑量的個人應接種第三劑疫苗。這包括滿足以下任一條件的個人：

- 因腫瘤或血癌，正在接受相應的癌症治療
- 接受了器官移植，且正在服用抑制免疫系統的藥物
- 最近2年內接受過幹細胞移植或正在服用抑制免疫系統的藥物
- 中度或重度原發性免疫缺陷（例如狄喬治氏症候群(DiGeorge syndrome)或威斯科特-奧爾德里奇症候群(Wiskott-Aldrich syndrome)）
- 愛滋病毒感染晚期，或未治療的愛滋病毒感染
- 正在使用大劑量皮質類固醇或其他可能抑制免疫反應的藥物進行治療

第三劑疫苗的品牌應與你接種的原始COVID-19疫苗系列相同。請諮詢你的醫生，詢問是否需要額外接種一劑 COVID-19疫苗，並詢問根據你目前的治療計劃何時是最佳的接種時機。如果你正準備開始或重新開始接受免疫抑制治療，這一點尤為重要。

在接種完額外（第三劑）疫苗的至少6個月後，你可以考慮接種加強劑疫苗。該加強劑可以是任何一種COVID-19疫苗。

輝瑞——額外劑應該選擇輝瑞疫苗



莫德納——額外劑應該選擇莫德納疫苗



接種的疫苗原始劑量為強生疫苗

CDC建議，對於有中度至重度免疫功能受損，且已接種強生疫苗原始劑量的個人應接種加強劑疫苗。請諮詢你的醫生，詢問根據你目前的治療計劃何時是最佳的接種時機。如果你正準備開始或重新開始免疫抑制治療，這一點尤為重要。

