



Loại Các Liều Chính Đã Được Chích Ngừa Là Vắc-xin Pfizer hoặc Moderna

Những người bị suy giảm hệ thống miễn dịch ở mức độ trung bình hoặc nặng được khuyến nghị chích một liều bổ sung (liều thứ 3) của vắc-xin mRNA.


CDC khuyến nghị rằng những người bị suy giảm miễn dịch ở mức độ từ trung bình đến nặng mà đã được chích ngừa loại các liều chính của vắc-xin Pfizer hoặc Moderna nên chích thêm một liều thứ 3. Điều này bao gồm những người:

- Đang được điều trị tích cực cho ung thư khối u hoặc ung thư máu
- Đã được cấy ghép nội tạng và đang dùng thuốc ức chế hệ thống miễn dịch
- Đã được cấy ghép tế bào gốc trong vòng 2 năm qua hoặc đang dùng thuốc ức chế hệ thống miễn dịch
- Bị suy giảm miễn dịch tiên phát ở mức độ trung bình hoặc nặng (như hội chứng DiGeorge, hội chứng Wiskott-Aldrich)
- Bị nhiễm HIV giai đoạn nặng hoặc không được điều trị
- Đang được điều trị tích cực bằng corticosteroids liều cao hoặc các loại thuốc ức chế đáp ứng miễn dịch khác


Liều thứ 3 này cần phải là cùng loại vắc-xin COVID-19 mà quý vị đã được chích ngừa cho loạt các liều chính. Tham khảo ý kiến của bác sĩ của quý vị về sự cần thiết phải chích ngừa thêm một liều vắc-xin COVID-19 và về thời điểm tốt nhất để chích ngừa dựa trên kế hoạch điều trị hiện tại của quý vị. Điều này đặc biệt quan trọng nếu như quý vị sắp bắt đầu hoặc bắt đầu lại quá trình điều trị ức chế miễn dịch.

Có thể cân nhắc chích liều tăng cường sau ít nhất 6 tháng tính từ ngày được chích liều bổ sung (liều thứ 3) và liều tăng cường có thể là của bất kỳ loại vắc-xin COVID-19 nào.

Vắc-xin Pfizer – Liều bổ sung cần phải là vắc-xin Pfizer



Vắc-xin Moderna – Liều bổ sung cần phải là vắc-xin Moderna



Liều Chính Đã Được Chích Ngừa Là Vắc-xin Johnson & Johnson (J&J)

CDC khuyến nghị rằng những người bị suy giảm miễn dịch ở mức độ từ trung bình đến nặng mà đã được chích ngừa liều chính là vắc-xin J&J nên chích thêm một liều tăng cường. Tham khảo ý kiến của bác sĩ của quý vị về thời điểm tốt nhất để chích ngừa dựa trên kế hoạch điều trị hiện tại của quý vị. Điều này đặc biệt quan trọng nếu như quý vị sắp bắt đầu hoặc bắt đầu lại quá trình điều trị ức chế miễn dịch.

