


Apretude (PrEP inyectable)



LO QUE DEBE SABER

¿QUÉ ES?

Apretude es la primera y única PrEP inyectable de acción prolongada para disminuir el riesgo de contraer el VIH. Se administra cada dos meses por un proveedor de atención a la salud

después de que las inyecciones de iniciación se hayan administrado con un mes de intervalo durante 2 meses consecutivos.

¿CUÁNDO ESTOY PROTEGIDO?

Aunque se desconoce el tiempo hasta alcanzar la máxima protección, la mayoría de las personas deberían alcanzar los niveles máximos de protección a los 7 días de recibir la inyección para prevenir una posible transmisión del VIH.

EFFECTOS SECUNDARIOS FRECUENTES

Los efectos secundarios más frecuentes tras recibir la inyección son dolor e hinchazón en el lugar de aplicación.

Después de la inyección de PrEP:

- ♦ tome un analgésico de venta libre, como paracetamol o naproxeno, un par de horas antes o poco después de la inyección y continúe durante uno o dos días, según sea necesario
- ♦ coloque una compresa caliente o una almohadilla térmica en el lugar de la inyección, según sea necesario

Para mantener la máxima protección contra el VIH, es importante que reciba las inyecciones a su debido tiempo.

1era inyección (Día 1)

DE:

2da inyección (Mes 1)

VENCE LA SEMANA DE:

3era inyección (Mes 3)

VENCE LA SEMANA DE:

4ta inyección (Mes 5)

VENCE LA SEMANA DE:

5ta inyección (Mes 7)

VENCE LA SEMANA DE:

6ta inyección (Mes 9)

VENCE LA SEMANA DE:

7ma inyección (Mes 11)

VENCE LA SEMANA DE: