



ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ วัคซีนโควิด-19

วัคซีนป้องกันไม่ให้เกิดผลที่ร้ายแรงที่สุดจากโควิด



- วัคซีนป้องกันโควิด-19 ช่วยลดความเสี่ยงที่คุณจะป่วยหนักจากโควิด-19 เพื่อไม่ให้คุณต้องเข้าโรงพยาบาลหรือเสียชีวิต นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงภาวะลองโควิด
- ขณะนี้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ Pfizer และ Moderna เป็นวัคซีนที่ได้รับการอัปเดตแล้ว (2 สายพันธุ์) ซึ่งการปรับปรุงเพื่อป้องกันไวรัสใหม่ล่าสุดหลายสายพันธุ์

สามารถรับวัคซีนได้ฟรี

- ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ **ฟรี** สำหรับทุกคน แม้ว่าคุณจะไม่มีความเสี่ยงก็ตาม
- คุณมีสิทธิได้รับวัคซีน และจะไม่มีการสอบถามถึงสถานะการเข้าเมืองของคุณ




ฟรี



ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปควรได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดที่ได้รับการอัปเดตอย่างน้อย 1 เข็ม

- **ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป** ที่ได้รับวัคซีนที่อัปเดตแล้ว ไม่ต้องรับวัคซีนเพิ่ม ผู้ที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้ อาจต้องได้รับวัคซีนเพิ่ม:
 - **ผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป** สามารถรับวัคซีนที่อัปเดตเข็มที่สอง ห่างกันอย่างน้อย 4 เดือนหลังจากได้รับวัคซีนที่อัปเดตเข็มแรก
 - **ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง** สามารถรับวัคซีนที่อัปเดตเพิ่มได้ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับนัดหมายที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
- **ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน** ควรได้รับวัคซีนที่อัปเดตหนึ่งเข็มทันที
- **ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว** แต่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน ที่อัปเดตควรได้รับวัคซีน 1 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 2 เดือนหลังจากรับวัคซีนเดิม (สายพันธุ์เดียว) เข็มล่าสุด
- **เด็กอายุ 6 เดือนถึง 5 ปี** อาจต้องได้รับวัคซีนหลายเข็มรวมถึงโดสที่ได้รับการอัปเดตแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม จำนวนเข็มขึ้นอยู่กับอายุและวัคซีนที่ได้รับไปแล้ว
- ทุกคนควรได้รับการฉีดวัคซีนแม้ว่าจะตั้งครรถ์หรือให้นมบุตร หรือเคยติดเชื้อโควิด-19 แล้วก็ตาม
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านที่ [cdc.gov/coronavirus/vaccine](https://www.cdc.gov/coronavirus/vaccine)



หมายเหตุ: สามารถฉีดวัคซีน Novavax ชนิดสายพันธุ์เดียวให้กับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป และเป็นเข็มกระตุ้นสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปใน**บางสถานการณ์** วัคซีน J&J ชนิดสายพันธุ์เดียวจะไม่มีให้บริการในสหรัฐอเมริกาอีกต่อไป



ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ วัคซีนโควิด-19

จะรับวัคซีนได้อย่างไร?

มีศูนย์ฉีดวัคซีนหลายร้อยแห่งทั่วทั้งมณฑลลอสแอนเจลิส หลายแห่งเปิดทำการในวันหยุดสุดสัปดาห์และตอนเย็น และไม่ต้องนัดหมาย

เพื่อค้นหาสถานที่ฉีดวัคซีนในพื้นที่ใกล้บ้านคุณ:

- ไปที่ ph.lacounty.gov/howtogetvaccinated หรือโทร **1-833-540-0473**

• คุณสามารถโทรไปยัง 2-1-1 หรือสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรในท้องถิ่นของคุณ
มีบริการขนส่งและฉีดวัคซีนถึงบ้านฟรี
ผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายก่อนได้รับวัคซีน



ผลข้างเคียงที่รุนแรงพบได้ยาก

- ผลข้างเคียงที่พบบ่อย ได้แก่ ปวด บวม และแดงบริเวณที่ฉีดวัคซีน ปวดกล้ามเนื้อ หรือข้อต่อ ต่อม้ำเหลืองบวม มีไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ และรู้สึกเหนื่อย นอกจากนี้ ผลข้างเคียงในเด็กเล็กยังรวมถึงการร้องไห้ อาการหงุดหงิด ง่วงนอน และเบื่ออาหาร
- ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าระบบภูมิคุ้มกันของคุณ **กำลังสร้าง การปกป้องร่างกาย** โดยอาการเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกิจกรรมประจำวันของคุณ แต่อาการควรหายเองภายใน 1 หรือ 2 วันหลังรับวัคซีน
- ผลข้างเคียงที่รุนแรงเกิดขึ้นได้ แต่พบได้น้อย



วัคซีนป้องกันโควิด-19 ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

- คุณจะไม่ได้รับเชื้อโควิด-19 จากวัคซีน ไม่มีวัคซีนใดมีไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19
- วัคซีนผ่านการทดสอบในผู้คนหลายหมื่นคน ซึ่งรวมถึงคนทุกสีผิว ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีอาการป่วยต่าง ๆ และเราพบว่าวัคซีน**ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ**
- ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2020 **ผู้คนหลายร้อยล้านคน**ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างปลอดภัย
- วัคซีนโควิด-19 ได้รับการ**เฝ้าระวังความปลอดภัยอย่างเข้มข้น** ขณะนี้ยังมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
- ไม่มีหลักฐานว่าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทำให้เกิดภาวะเป็นหมัน วัคซีนเหล่านี้มีความปลอดภัยสำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์และได้รับการแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งครรภ์

