


Guía Informativa acerca de la Gonorrea:

Síntomas, tratamiento y recursos

1. ¿Qué es la gonorrea?

La gonorrea es una Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS) muy común. Usted puede tener gonorrea en su vagina, pene, ano o garganta. La mayoría de las personas con gonorrea no tienen signos ni síntomas. Cuando las personas tienen síntomas, pueden ser leves al principio. Pueden aparecer inmediatamente o 30 días después de tener relaciones sexuales con alguien que tiene gonorrea.



Usted puede tener estos síntomas:

- Dolor o ardor al orinar (orín)
- Secreciones de la vagina, pene, o ano con un olor o apariencia extraña
- Picazón, dolor o sangrado por el ano o evacuaciones dolorosas (caca)
- Fiebre
- Sangrado vaginal durante o después del sexo
- Dolor o hinchazón en los testículos

2. ¿Es gonorrea una enfermedad grave?

Sí. Usted debe ver a un médico si piensa que tiene gonorrea.

Si usted no recibe tratamiento, puede:

- Transmitir la gonorrea a las personas con las que tiene relaciones sexuales
- Contraer más fácil otras enfermedades, como el VIH
- Diseminar la enfermedad a la sangre y articulaciones
- Tener problemas para quedar embarazada
- Tener un embarazo que crece fuera del útero, lo que puede causar la muerte
- Transmitir la infección a su bebé durante el parto
- Tener dolor en la parte baja del abdomen (para mujeres y personas con vagina) durante el sexo por meses o años
- Tener dolor o hinchazón en los testículos

3. ¿Cómo se transmite la gonorrea?

Usted puede contraer gonorrea durante el contacto sexual vaginal, anal o sexo oral con alguien que este infectado. La mayoría de las personas no saben que la tienen porque no tienen síntomas. Con solo mirar a una persona usted no puede saber si está infectada. Solo haciéndose una prueba es la única manera de saber si usted tiene gonorrea.

4. ¿Qué hacer si tengo gonorrea?

Siga estos 3 pasos importantes para curar la gonorrea:

1. Tome todo el medicamento que el médico o la enfermera le recetaron. No comparta sus medicamentos con nadie a menos que el médico o la enfermera se lo indiquen.
2. Asegúrese de que su pareja(s) sexual de los últimos 2 meses reciba el tratamiento para la gonorrea tan pronto como sea posible.
3. No tenga relaciones sexuales hasta 7 días después de que ambos, usted y su pareja sexual hayan terminado el tratamiento. Use un condón si tiene sexo antes de los 7 días.

Si usted no sigue todos estos pasos, puede contraer gonorrea otra vez y esto puede ser peor.

5. ¿Qué debo saber acerca de mi tratamiento?

No tenga relaciones sexuales hasta 7 días después de que usted y su pareja sexual hayan terminado la medicina. Le han dado la medicina que se indica a continuación:

<input type="checkbox"/>	Ceftriaxone: Medicamento inyectable dado en la clínica
--------------------------	---

Y, es posible que también se le haya dado los siguientes tratamientos para darle a su(s) pareja(s) sexual(es):

<input type="checkbox"/>	Cefixime: Tomar toda la medicina a la vez, tan pronto como se la den
<input type="checkbox"/>	Doxycycline: <i>(Este medicamento puede ser proporcionada si no se excluye la infección de clamidia.)</i> <ul style="list-style-type: none">- Tome 1 pastilla en la mañana y 1 pastilla por la noche por 7 días- No tome esta medicina si usted piensa que puede estar embarazada o si están amamantando- Tome este medicamento con alimentos o leche si tiene malestar estomacal- Usted puede ser fácilmente broceado por el sol , mientras que tome este medicamento

6. ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios del tratamiento?

Llame al 911 inmediatamente si tiene un silbido o dificultad para respirar. Llame a la clínica si usted tiene una erupción en la piel, granos, picazón, o un vomito sin parar.

7. ¿Mi pareja(s) sexual debe recibir también tratamiento?

Si. Hay muchas maneras para asegurarse de que su pareja sexual pueda conseguir medicamento para gonorrea:

- Cuando usted venga a su tratamiento, traiga a su pareja a la clínica
- Pregunte al doctor o enfermera si le pueden dar más medicina para llevarle a su pareja
- Pídale a su pareja que visite a su médico para obtener un tratamiento adecuado
- Visite www.tellyourpartner.org o www.stdcheck.com para enviar un mensaje de texto anónimo /correo electrónico diciéndole a su(s) pareja(s) que pueden tener gonorrea

8. ¿Qué pasa si estoy embarazada y tengo gonorrea?

Si piensa que está embarazada, díglele al doctor o a la enfermera antes de tomar algún medicamento. Díglele al doctor que está viendo para su embarazo que el examen de gonorrea resulto positivo. Si mantiene el embarazo, debe hacerse la prueba nuevamente en 3 a 4 semanas para asegurarse de que usted ha sido curada de la gonorrea. Si usted no recibe tratamiento, la gonorrea puede ser transmitida a su bebé y puede causar serias infecciones de los ojos, articulación o en la sangre.

9. ¿Puedo contraer gonorrea más de una vez?

Si. El haber tenido gonorrea no le impide infectarse otra vez. Infectarse con gonorrea otra vez puede causar otras infecciones y ser mucho más severo para su cuerpo.

Usted puede contagiarse otra vez si usted:

- Tiene sexo con alguien que no recibió tratamiento
- Tiene relaciones sexuales demasiado pronto después de que usted y su pareja sexual terminaron el tratamiento
- Tiene relaciones sexuales con una nueva pareja que tiene gonorrea

Llame a la línea de ETS para recursos e información sobre pruebas de bajo costo y condones: 800-758-0880

Es recomendable regresar a la clínica si los síntomas no desaparecen en unos pocos días. Usar un condón cada vez que tenga sexo, para evitar infectarse otra vez.

Si usted tuvo gonorrea en la garganta, debe hacerse la prueba otra vez en un mes. Si usted tuvo gonorrea, debe hacerse la prueba otra vez en 3 meses.