



***“Fue duro enterarme de esto, pero me alegro de haber recibido tratamiento inmediato.”***

#### **Aprenda más sobre la Clamidia y Gonorrea:**

- Llame gratis al 1-800-758-0880
- O visite [publichealth.lacounty.gov/dhsp](http://publichealth.lacounty.gov/dhsp)

# Clamidia y Gonorrea: Lo Que Debe Hacer Ya

Su pareja sexual tiene clamidia (kla-MID-ee-a) y/o gonorrea (go-no-RRE-a).

Las dos infecciones son curables y se propagan a través de tener relaciones sexuales. Usted puede tener clamidia/gonorrea también.

Su pareja ha tomado medicamentos para curar la clamidia/gonorrea. Debe tomar el mismo tipo de medicamento tan pronto como pueda.

## **Esto es lo que usted debe saber:**

- La clamidia/gonorrea es fácil de curar.
- Usted puede contraer clamidia/gonorrea al tener relaciones sexuales con el pene, la vagina o el ano. También puede contraerlo por tener sexo oral (boca en el pene o la vagina).
- Muchas personas tienen clamidia/gonorrea y no lo saben.
- Algunas personas tienen dolor, una sensación de ardor cuando orinan o una secreción (goteo).
- Si no recibe tratamiento, puede llegar a estar muy enfermo. O es posible que no pueda tener hijos nunca.
- Para las mujeres que no reciben tratamiento y posteriormente quedan embarazadas, la clamidia/gonorrea puede hacer daño a su bebé.

## **Obtenga Tratamiento**

- La mejor manera de librarse de esta infección es ir a una clínica inmediatamente.
- Si no puede ver a un médico en los próximos días, tome el medicamento que le trajo su pareja o llene la receta.
- Debido a que la gente puede tener más de una ETS (enfermedad de transmisión sexual) al mismo tiempo, es importante que usted visite una clínica tan pronto como sea posible para hacerse la prueba para otras ETS.



Cualquier persona que se muestra en estas fotos es modelo. Las fotos se utilizan sólo con fines ilustrativos.



## Así es como se toman las pastillas:

### **Para tratar la gonorrea**

**Cefixima (800mg):** Tome toda esta medicina en cuanto la reciba.

### **Para tratar la clamidia**

**Doxiciclina (100 mg):** Tome 1 pastilla en la mañana y 1 pastilla por la noche por 7 días. Tome este medicamento con comida o leche si le molesta el estómago.

**O Azitromicina (1 g):** Tome todo el medicamento tan pronto como lo reciba.

- NO tome antiácidos (como Tums o Roloids) durante una hora antes o dos horas después de tomar las pastillas.
- Usted puede ser fácilmente broceado por el sol, mientras que tome este medicamento.
- ¡NO comparta o de estas pastillas a nadie!

La mayoría de la gente no tiene problemas después de tomar estas pastillas.

- Algunas personas pueden sentir mareo o tener malestar estomacal o diarrea.
- Algunas mujeres pueden tener comezón y secreción de la vagina.

Estos problemas comunes desaparecerán por su cuenta en un par de días. Si no desaparecen, hable con su médico.

## Las pastillas son muy seguras para la mayoría de la gente.

Hable con su médico si...

- Alguna vez ha tenido una mala reacción, erupción, problemas respiratorios o una reacción alérgica después de tomar cualquier antibiótico.
- Si usted tiene problemas crónicos tales como enfermedad renal, del corazón o hígado.
- Si usted está tomando actualmente otro medicamento recetado.
- Sabes que estás embarazada, piensas que podrías estar embarazada o planeas estar embarazada.

En estos casos, es importante que hable con su médico inmediatamente sobre lo que debe hacer.

Si usted ha realizado sexo oral con alguien que estaba infectado con gonorrea, es posible que el medicamento no funcione bien. Usted debe ver a un médico para obtener un medicamento más fuerte.

## ¿Cuánto tiempo se necesita para que la infección desaparezca?

El medicamento toma 7 días para funcionar.

Durante 7 días después de tomar las pastillas:

- Lo mejor es no tener relaciones sexuales en absoluto con la vagina, pene, boca, o el ano.
- Sin embargo, si usted tiene relaciones sexuales, debe usar un condón o de lo contrario estará en peligro de contraer gonorrea de nuevo o transmitir la infección a su(s) pareja(s).

## Vaya inmediatamente con un médico, clínica o sala de emergencias si usted está:

- Resollando.
- Vomitando.
- Teniendo problemas para respirar.
- Tiene fiebre.
- Teniendo problemas para respirar.
- Tiene fiebre.

Si usted es un hombre y:

- Tiene inflamación o dolor en sus testículos (bolas).

Esto puede significar que usted puede necesitar medicamentos más fuertes. El medicamento que se le ha dado PUEDE NO SER suficiente para curar la infección.

## Hágase una prueba de gonorrea ahora.

- La prueba no duele. Usted sólo tiene que orinar (hacer pipí) en una taza.
- También se puede usar un hisopo de la vagina, el ano y/o la garganta para detectar algunas ETS. Puede usarlo usted mismo y enviarlo de vuelta a la clínica para obtener los resultados de su prueba.
- Cualquier persona con quien haya tenido relaciones sexuales en los últimos 60 días también debe hacerse la prueba.
- Hágase otra prueba en 3 meses para asegurarse de que usted no contrajo la infección de nuevo.

## Encuentre una clínica cercana a usted:

- Pregúntele a su pareja donde él o ella se examinaron.
- Visite [gettested.cdc.org](https://gettested.cdc.org) o llame a la línea directa del CDC al 800-CDC-INFO o 800-232-4636.
- Hágase la prueba para otras Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) como sífilis y el VIH.
- Protéjase del VIH con PrEP o profilaxis de pre exposición, una pastilla diaria que la ayuda a mantenerse VIH negative.