



*“Fue duro enterarme de esto, pero me alegro de haber recibido tratamiento inmediato.”*

**Aprenda más sobre la Tricomoniasis:**

- Llame gratis al 1-800-758-0880
- O visite [publichealth.lacounty.gov/dhsp](http://publichealth.lacounty.gov/dhsp)

# Tricomoniasis: Lo Que Debe Hacer Ya

Su pareja sexual tiene tricomoniasis (tri-co-mo-NIA-sis).

Esta es una infección curable que la gente puede contraer al tener relaciones sexuales. Usted puede tener tricomoniasis también.

Su pareja ha tomado medicamentos para tratar la tricomoniasis. Usted debe tomar el mismo tipo de medicamento lo más pronto posible.

## Here's what you need to know:

- La tricomoniasis es fácil de curar. Pero tanto usted como su pareja (s) deben tomar todos sus medicamentos inmediatamente.
- Usted puede contraer tricomoniasis al tener relaciones sexuales (sexo vaginal, sexo oral, o el uso de juguetes sexuales).
- Muchas personas tienen tricomoniasis y no lo saben.
- Los hombres con tricomoniasis pueden tener dolor en el pene, una sensación de ardor al orinar, o una secreción del pene. Las mujeres pueden tener una irritación o una secreción maloliente de la vagina.
- Si una mujer no recibe tratamiento y posteriormente queda embarazada, la tricomoniasis puede afectar su embarazo y podría causar que su bebé nazca antes de tiempo.

## Obtenga Tratamiento

- La mejor manera de librarse de esta infección es ir a una clínica inmediatamente.
- Su pareja puede traerle pastillas o una receta médica para obtenerlas. Es importante tomar las pastillas tan pronto como sea posible.
- Debido a que la gente puede tener más de una ETS (enfermedad de transmisión sexual) al mismo tiempo, es importante que usted visite una clínica tan pronto como sea posible para hacerse la prueba para otra ETS.



Cualquier persona que se muestra en estas fotos es modelo. Las fotos se utilizan sólo con fines ilustrativos.



## Así es como se toman las pastillas:

Siga las instrucciones del medicamento que le dieron.

### **Metronidazol (2 g):** **Metronidazol (500 mg):**

Tome toda esta medicina en cuanto la reciba.

Tome 1 pastilla en la mañana y 1 pastilla por la noche por 7 días.

- NO beba alcohol durante 24 horas después de tomar esta medicina. Podría enfermarte mucho.
- Do NO tome antiácidos (como Zantac o Pepcid) durante una hora antes o dos horas después de tomar las pastillas.
- ¡NO comparta o de estas pastillas a nadie!

La mayoría de la gente no tiene problemas después de tomar estas pastillas.

- Algunas personas pueden tener malestar estomacal, náuseas, vómitos o diarrea.
- Algunas personas también pueden notar un oscurecimiento de su orina.

Estos problemas comunes desaparecerán por su cuenta en un par de días. Si no desaparecen, hable con su médico.

## Las pastillas son muy seguras para la mayoría de la gente.

Hable con su médico si...

- Alguna vez ha tenido una mala reacción, erupción, problemas respiratorios o una reacción alérgica después de tomar cualquier antibiótico.
- Si usted tiene problemas crónicos tales como enfermedad renal, del corazón o hígado.
- Si usted está tomando actualmente otro medicamento recetado.

## ¿Cuánto tiempo se necesita para que la infección desaparezca?

El medicamento toma 7 días para funcionar.

Durante 7 días después de tomar las pastillas:

- Lo mejor es no tener relaciones sexuales en absoluto con la vagina, pene, boca, o el ano. También es mejor no usar ningún juguete sexual.
- Sin embargo, si usted tiene relaciones sexuales, debe usar un condón o de lo contrario estará en peligro de contraer tricomoniasis de nuevo o transmitir la infección a su(s) pareja(s).

## Vaya inmediatamente con un médico, clínica o sala de emergencias:

Si usted es una mujer y:

- Tiene dolor en la parte inferior del estómago.
- Tener dolor con las relaciones sexuales.
- Está vomitando.
- Tiene erupción o fiebre.

Si usted es un hombre y:

- Tiene dolor o hinchazón en los testículos (bolas).
- Tiene erupción o fiebre.

Esto puede significar que usted puede necesitar medicamentos más fuertes. El medicamento que se le ha dado PUEDE NO SER suficiente para curar la infección.

## Hágase una prueba de tricomoniasis ahora.

- La prueba no duele.
- Es posible que un médico o enfermero necesite tomar un simple hisopo de líquido de la vagina.
- Hágase otra prueba en 3 meses para asegurarse de que usted no contrajo la tricomoniasis de nuevo.

## Encuentre una clínica cercana a usted:

- Pregúntele a su pareja donde él o ella se examinaron.
- Visite [gettested.cdc.org](https://www.gettested.cdc.org) o llame a la línea directa del CDC al 800-CDC-INFO o 800-232-4636.
- Hágase la prueba para otras Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) como sífilis y el VIH.
- Protéjase del VIH con PrEP o profilaxis de pre exposición, una pastilla diaria que la ayuda a mantenerse VIH negative.