



***“Fue duro enterarme de esto, pero me alegro de haber recibido tratamiento inmediato.”***

#### **Aprenda más sobre la Clamidia:**

- Llame gratis al 1-800-758-0880
- O visite [publichealth.lacounty.gov/dhsp](http://publichealth.lacounty.gov/dhsp)

# Clamidia: Lo Que Debe Hacer Ya

Su pareja sexual tiene clamidia (kla-MID-ee-a).

Esta es una infección que las personas pueden contraer al tener relaciones sexuales. Usted puede tener clamidia también.

Su pareja ha tomado medicamentos para curar la clamidia. Usted debe tomar el mismo tipo de medicamento lo más pronto posible.

#### **Esto es lo que usted debe saber:**

- La clamidia es fácil de curar. Pero tanto usted como su pareja(s) deben tomar todos sus medicamentos inmediatamente.
- Usted puede contraer clamidia al tener relaciones sexuales con el pene, la vagina o el ano. También puede contraerlo por tener sexo oral (boca en el pene o la vagina).
- Muchas personas tienen clamidia y no lo saben.
- Algunas personas tienen dolor o una secreción (goteo).
- Si no recibe tratamiento, puede llegar a estar muy enfermo. O es posible que no pueda tener hijos nunca.
- Para las mujeres que no reciben tratamiento y posteriormente quedan embarazadas, la clamidia puede hacer daño a su bebé.

#### **Obtenga Tratamiento**

- La mejor manera de librarse de esta infección es ir a una clínica inmediatamente.
- Si no puede ver a un médico en los próximos días, tome el medicamento que le trajo su pareja o llene la receta.
- Debido a que la gente puede tener más de una ETS (enfermedad de transmisión sexual) al mismo tiempo, es importante que usted visite una clínica tan pronto como sea posible para hacerse la prueba para otra ETS.



Cualquier persona que se muestra en estas fotos es modelo. Las fotos se utilizan sólo con fines ilustrativos.



## Así es como se deben tomar las pastillas:

### Azitromicina (1 g):

Tome todo el medicamento tan pronto como lo reciba.

- NO tome antiácidos (como Tums o Roloids) durante una hora antes o dos horas después de tomar las pastillas.
- ¡NO comparta o de estas pastillas a nadie!

La mayoría de la gente no tiene problemas después de tomar estas pastillas.

- Algunas personas pueden sentir mareo o tener malestar estomacal o diarrea.
- Algunas mujeres pueden tener comezón y secreción de la vagina.

Estos problemas comunes desaparecerán por su cuenta en un par de días. Si no desaparecen, hable con su médico.

## Las pastillas son muy seguras para la mayoría de la gente.

Hable con su médico si...

- Alguna vez ha tenido una mala reacción, erupción, problemas respiratorios o una reacción alérgica después de tomar cualquier antibiótico.
- Si usted tiene problemas crónicos tales como enfermedad renal, del corazón o hígado.
- Si usted está tomando actualmente otro medicamento recetado,

## ¿Cuánto tiempo se necesita para que la infección desaparezca?

El medicamento toma 7 días para funcionar.

Durante 7 días después de tomar las pastillas:

- Lo mejor es no tener relaciones sexuales en absoluto con la vagina, pene, boca, o el ano.
- Sin embargo, si usted tiene relaciones sexuales, debe usar un condón o de lo contrario estará en peligro de contraer clamidia de nuevo o transmitir la infección a su(s) pareja(s).

## Vaya inmediatamente con un médico, clínica o sala de emergencias:

Si usted es una mujer y:

- Tiene dolor en la parte inferior del estómago.
- Tener dolor con las relaciones sexuales
- Está vomitando.
- Tiene erupción o fiebre.

Si usted es un hombre y:

- Tiene dolor o hinchazón en los testículos (bolas).
- Tiene erupción o fiebre.

Esto puede significar que usted puede necesitar medicamentos más fuertes. El medicamento que se le ha dado PUEDE NO SER suficiente para curar la infección.

## Hágase una prueba de clamidia ahora.

- La prueba no duele. Usted sólo tiene que orinar (hacer pipí) en una taza.
- También se puede usar un hisopo de la vagina, el ano y/o la garganta para detectar algunas ETS. Puede usarlo usted mismo y enviarlo de vuelta a la clínica para obtener los resultados de su prueba.
- Cualquier persona con quien haya tenido relaciones sexuales en los últimos 60 días también debe hacerse la prueba.
- Hágase otra prueba en 3 meses para asegurarse de que usted no contrajo la gonorrea de nuevo.

## Encuentre una clínica cercana a usted:

- Pregúntele a su pareja donde él o ella se examinaron.
- Visite [gettested.cdc.org](http://gettested.cdc.org) o llame a la línea directa del CDC al 800-CDC-INFO o 800-232-4636.
- Hágase la prueba para otras Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) como sífilis y el VIH.
- Protéjase del VIH con PrEP o profilaxis de pre exposición, una pastilla diaria que la ayuda a mantenerse VIH negative.