

Sífilis

1. ¿Qué es la Sífilis?

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) causada por bacterias (gérmenes). La sífilis es fácil de curar. Sin tratamiento, puede dañar los órganos de su cuerpo. La sífilis congénita es cuando una mujer embarazada le pasa la sífilis a su bebé durante el embarazo o el parto. Puede causar que una mujer tenga un bebé demasiado pronto o causar un aborto involuntario o muerte fetal (un bebé nacido muerto). También puede conducir a graves problemas de salud en los bebés.

2. ¿Cómo se propaga esta enfermedad?

Puede contraer sífilis si tiene contacto con una llaga de sífilis durante el sexo vaginal, anal u oral. Las llagas se pueden encontrar en el pene, la vagina, el ano o en los labios y la boca. Es posible que no vea las llagas y no le causen dolor. La sífilis congénita se transmite de la madre al bebé durante el embarazo o el parto.

3. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad?

A menudo las personas no notan síntomas, por lo que no saben que están infectadas. Los signos de sífilis pueden incluir una llaga cerca del área donde el germen entró al cuerpo (vagina, ano, labios o boca) o erupción en una o más áreas del cuerpo. Los síntomas pueden aparecer y desaparecer. La única forma de saberlo con seguridad es hacerse la prueba.

4. ¿Cuándo debo hacerme la prueba?

Hágase la prueba si está experimentando síntomas. Hágase la prueba si está haciendo una prueba para otras ETS. Si está teniendo relaciones sexuales sin usar un condón y / o tiene múltiples parejas sexuales, hágase la prueba cada 6 meses. Si usted es un hombre que tiene relaciones sexuales con otros hombres, hágase la prueba cada 3 a 6 meses. Hágase la prueba si es mujer y planea quedar embarazada. Si está embarazada, recuérdela a su médico que le haga la prueba tres veces: durante el primer trimestre (1 a 12 semanas), el tercer trimestre (28 a 32 semanas) y el parto.

5. ¿Cómo se trata esta enfermedad?

La sífilis se puede tratar y curar con antibióticos (medicamento que mata los gérmenes). Asegúrese de que su(s) pareja(s) sexual(es) sean examinados y tratados también. Esto les ayudará a mantenerse saludables, evitar contagiar a otros y evitar re-infectandote.

6. ¿Cómo puedo prevenir esta enfermedad?

- Usar condones.
- Diríjase a su médico para realizar pruebas y tratamiento lo antes posible. Si no tiene un médico de particular, llame a la línea directa gratuita de ETS (800) 758-0880 para averiguar dónde puede hacerse la prueba y recibir tratamiento de forma gratuita.



Puntos Clave

- La sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual están aumentando en el condado de Los Ángeles.
- Los síntomas comunes de la sífilis incluyen una llaga o erupción, pero muchas personas no ven signos.
- Hágase una prueba de sífilis.
- La sífilis se trata y se cura con antibióticos.

Para más información:

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés)

<https://www.cdc.gov/std/spanish/sifilis/stdfact-syphilis-s.htm>

Oficina de Salud de las Mujeres de los Estados Unidos

<https://espanol.womenshealth.gov/a-z-topics/syphilis>

DHSP-STD-0032-02 (04/30/19)