




คำเตือน

โรคไวรัสซิกา




พื้นที่ต่างๆ
ในเขตอเมริกากลางและใต้
แคริบเบียนและเม็กซิโกมียุงที่สามารถ
ทำให้เกิดโรคไวรัส ซิกา
หากท่านมีครรภ์และได้รับเชื้อไวรัสซิกา
ทารกของท่านอาจเกิดมาพร้อมความ
พิการแต่กำเนิด



การเดินทางไปทางใต้ของสหรัฐอเมริกา

	เมื่ออยู่ข้างนอก ใช้สเปรย์กำจัดแมลงที่ผ่านการรับรองของ หน่วยงานป้องกันสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Agency) (EPA)
	ใส่เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวเพื่อห ลี่ยงการถูกยุงกัด
	พักหรือนอนในห้องที่มีม่านกันยุงหรือห้องติด แอร์

การกลับสู่สหรัฐฯ

	ตรวจเช็คอาการของโรคภายใน 14 วันหลังการเดินทาง
	หากท่านมีไข้ ปวดข้อหรือกล้ามเนื้อ ผื่นแดงหรือตาแดง โทรหาแพทย์ของท่านและปรึกษาเรื่องการ เดินทางของท่าน
	หากท่านตั้งครรภ์ โปรดโทรปรึกษาแพทย์ของท่านเกี่ยวกับทำ นหรือการเดินทางของคุณของท่าน แม้ว่าท่านจะยังไม่มีอาการใดๆ

สำหรับข้อมูลการเดินทางล่าสุด โปรดดูที่เว็บไซต์ <http://wwwnc.cdc.gov/travel>

CDCP-ACDC-0081-13 (02/23/16)