

¿Que puede hacer su médico para tratar una hemorragia después de tener un bebé?

- Masaje uterino
- Dar medicina para detener el sangrado
- Dar suero
- Dar sangre
- Dar antibióticos
- Remover la placenta



Hable con su proveedor de cuidado médico si quiere saber mas acerca de una hemorragia después de tener un bebé.



*No tenga miedo.
Prepárese.*

Para obtener más información, visite nuestro sitio web:
<http://publichealth.lacounty.gov/mch/ReproductiveHealth/LACMQCC/lacmqcc.htm>



Este proyecto fue fundado a través de fondos de Title V California Department of Public Health; Maternal, Child and Adolescent Health Division

¿Está usted a riesgo de una hemorragia después de tener su bebé?



Tener un bebé es un momento feliz, pero pueden haber problemas.



*Sangrar después de dar a luz es normal.
Sangrado en exceso puede ser peligroso.*

Riesgos:

- No recibir cuidado prenatal
- Parto largo (mas de 18 horas)
- Infección durante el parto
- Propensa a hemorragias
- Uso de drogas para provocar el parto
- Cesáreas previas
- Cesáreas innecesarias
- Mas de 3 partos

Dígale a su medico si usted tiene algún factor de riesgo

¿Cómo puede saber si está sangrando excesivamente después de tener un bebé?

- Empapando más de 4 toallas sanitarias en una hora
- Bastante hinchazón y extremo dolor en su vagina o recto
- Sentirse mareada
- Palpitación rápida del corazón



¿Qué puede hacer si un hemorragia empieza en casa?



- Llame 9-1-1
- Llame a su medico