

新型冠状病毒 (COVID-19)

洛杉矶县公共卫生局 葬礼举行指南

最近更新信息:

2020年7月31日: 不允许提供室内服务。

葬礼仪式和墓地葬礼服务可按以下要求进行:

- 此类服务可根据家庭偏好和宗教习俗在室外进行。
 - 对于在室外举行的活动而言, 只要家庭群体之间能够保持 6 英尺的身体距离, 则出席人数不受限制。
- 做好安排, 确保室外活动的参加者可以安全地使用卫生间。

举行场地可选择提供简易式户外厕所和洗手设施及/或提供室内卫生间。如设有室内洗手间设施, 应采取下列预防措施:

 - 已明确指出从用于活动的室外区域到室内卫生间的路线。
 - 如果出席者必须排队使用卫生间, 则使用胶带或其他标记来确保出席者之间能够保持身体距离。
 - 鼓励参加活动的人在服务或活动结束后根据需要使用洗手间, 以避免拥挤。
 - 洗手间设施运转正常, 并配备足够的肥皂和一次性使用的毛巾, 以便进行所需的洗手。
 - 调整厕所设施的布置, 以允许在有墙的隔间之外使彼此间能够保持身体距离。
 - 在洗手间入口处安排一名工作人员 (或如果有多个室内洗手间, 可安排多名工作人员), 佩戴布面面罩, 但距离最近的到达或离开洗手间的人员至少 6 英尺远, 以监测面罩的佩戴情况和记录卫生间的使用人数情况。
- 所有人都必须遵守保持身体距离的准则。
 - 请注意, 保持身体距离的要求不适用于同一家庭的成员。住在一起的个人可以坐在一起, 也可以站在一起, 同一家庭群体和任何其他出席者之间需要保持 6 英尺的空间距离。
 - 负责葬礼的工作人员可以引导参加葬礼的出席者到达相距 6 英尺的地点, 并使用标记来确定适当的间距, 或使用其他方法来确保哀悼者之间能够保持足够的距离。
 - 父母或其他家庭成员必须确保儿童安全地参与葬礼。根据儿童的年龄和家庭的偏好:
 - 葬礼期间, 儿童可能被携带或放置在婴儿车或其他提篮中;
 - 儿童可以坐在或站在对其负责的成人旁边; 或
 - 可允许儿童站在或坐在与哀悼者群体隔开的地方, 但距离要足够近, 以便有成年人认真监督其行为。
 - 邀请参加葬礼的家庭有责任教导他们的孩子不要接触任何不属于他们家庭的人士, 或任何不属于他们的物品。
 - 根据需要部署工作人员, 以确保所有人能够保持适当的身体距离, 并在葬礼的不同阶段指挥人流。
- 必须采取措施, 以避免 COVID-19 在葬礼服务出席者中传播。

新型冠状病毒 (COVID-19)

洛杉矶县公共卫生局 葬礼举行指南

- 如果被邀请参加葬礼的人士已被确诊为患有 COVID-19，出现符合 COVID-19*的症状，或曾接触过 COVID-19 检测呈阳性的人士，则应指示他们避免亲自到场出席葬礼。
- 个人应在到达葬礼现场时接受口头筛查，看是否出现呼吸道症状（如咳嗽或呼吸急促或呼吸困难）或发烧。出现呼吸道症状或发烧的个人，必须要求他们回家进行自我隔离。
- 鼓励因感染 COVID-19 而易患重病的高风险人群（超过 65 岁的老人，患有慢性呼吸系统疾病或免疫系统疾病的个人）不参加葬礼，以保护他们个人的健康。
 - 该服务可以以实时直播的方式进行，以允许任何不能安全参加的人进行虚拟参与（请参见源自[国家殡葬协会](#)的网络广播资源）。该服务也可以录下来，以备以后观看。
- 除 2 岁以下儿童或戴面罩有风险的个人外，所有出席者在葬礼期间必须始终佩戴布面口罩。
- 应为家庭成员和工作人员提供纸巾和含酒精的消毒擦手液，且洗手间必须备有充足的肥皂和纸巾。垃圾桶应随时可供弃置面巾纸和纸巾。
- 人们不应该触摸或亲吻死于 COVID-19 的逝者的尸体。如果发生触摸，应在触摸自己的脸和任何东西或任何人之前洗手或使用消毒擦手液。
- 在葬礼及相关服务和活动中，应使用室外环境进行此类事宜。
- 在可能的情况下，应限制共享物品的使用。应避免使用难以消毒或难以确保社交（身体）距离的物品，设备和用品（例如帐篷墙）。
 - 如果为葬礼提供了一个程序，它应该是一次性的形式。
 - 必须作为特定服务一部分的共享物品，需要在每次有使用者使用过之后对其进行消毒。
- 不提供自助食品和饮料。
- 加州公共卫生署指出，“当进行唱歌和吟诵等活动时，通过保持 6 英尺身体距离而实现传染风险降低的对策已不再有效”，因为从感染者口中喷出飞沫以致传播病毒的可能性已经增加。
 - 如果需要进行此类活动，这些活动应该在室外进行，以使彼此之间保持更远的距离，或者通过其他方法（例如互联网在线直播）的方式，确保每位会众成员能在自己的家里单独进行这些活动。
 - 请点击[此处](#)查阅关于“礼拜场所和宗教服务及文化仪式提供方的洛杉矶县行业指南”（最新版）。

* COVID-19 的症状可能同时包括以下几种：发烧，咳嗽，呼吸急促或呼吸困难，发冷，肌肉或身体疼痛，头痛，喉咙痛，鼻塞或流鼻涕，腹泻，恶心或呕吐，或新出现的味觉或嗅觉丧失。所列的症状并不包括所有的症状。