

مسیرهای تصمیم‌گیری غربالگری و مواجهه برای
افراد علامت دار و مخاطبین افراد بالقوه مبتلا
در مؤسسه آموزشی


اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس

بروزرسانی شده: 1/19/2021

مسیرهای تصمیم‌گیری غربالگری و مواجهه برای
کودکان در یک مؤسسه آموزشی و مخاطبین نزدیک آنان در مجموعه

مسیرهای تصمیم‌گیری برای کودکان غربال شده در خصوص علائم و موارد مواجهه با بیماری پیش از ورود¹ به یک مؤسسه آموزشی

¹ در صورت نامساعد شدن حال کودک در مجموعه، او را در یک محوطه‌ی ایزوله قرار دهید (از لحاظ فیزیکی دور از حاضران، در حالت ایده آل در¹ فضای باز) و مسیرهای تصمیم‌گیری که در زیر شرح داده شده است را دنبال کنید.




علائم مشابه با عفونت احتمالی کووید-19 در کودکان عبارتند از: تب $\leq 100.4^{\circ}\text{F}$ ؛ سرفه جدید (متفاوت از سرفه عادی)؛ اسهال یا استفراغ. در صورتی که علائم کودک با ابتلای احتمالی به کووید-19 سازگار نیست اما همچنان نگرانی وجود دارد، توصیه می‌شود ارزیابی کودک توسط یک ارائه دهنده خدمات پزشکی صورت گیرد.

مسیرهای تصمیم‌گیری برای مخاطبین کودک¹ بالقوه مبتلا در یک مؤسسه آموزشی

¹ یک کودک بالقوه مبتلا کودکیست که دارای 1 یا تعداد بیشتری از علائم مشابه با ابتلای احتمالی به عفونت کووید-19 است. علائم عبارتند از تب $\leq 100.4^{\circ}\text{F}$ ؛ سرفه جدید (متفاوت از سرفه عادی)؛ اسهال یا استفراغ.

مخاطب کودک بالقوه مبتلا، کودک یا کارمندی در مجموعه است که در تماس نزدیک با کودک بالقوه مبتلا بوده (در یک بازه زمانی 24 ساعته مجموعاً 15 دقیقه یا بیشتر در فاصله 6 فوتی وی بوده) یا با مایعات بدن/ترشحات کودک بالقوه مبتلا تماس مستقیم داشته؛ یا عضو کلاس یا گروه هم‌بازی می‌باشد که در معرض کودک مبتلا قرار داشته است.



² مواجهه تأیید می‌شود مشروط به آنکه مؤسسه اطلاعیه‌ای دریافت کند که تست تشخیصی ویروسی کووید-19 کودک بالقوه مبتلا، مثبت شده است یا ارائه دهنده خدمات پزشکی ابتلای او به عفونت کووید-19 را تشخیص داده است.

مسیرهای تصمیم‌گیری غربالگری و مواجهه برای
کارمندان در یک مؤسسه آموزشی و مخاطبین نزدیک آنان در مجموعه

مسیرهای تصمیم‌گیری برای کارمندان غربال شده در خصوص علائم و موارد مواجهه با بیماری

پیش از ورود به یک مؤسسه آموزشی

¹ در صورت نامساعد شدن حال کارمند در مجموعه، او را در یک محوطه‌ی ایزوله قرار دهید (از لحاظ فیزیکی دور از حاضران، در حالت ایده آل در فضای باز) و مسیرهای تصمیم‌گیری زیر را دنبال کنید.




*مطابق دستورالعمل‌های موقت CDC برای مشاغل و کارفرمایان (5/2020)، مشاغل می‌توانند کارمندان بزرگسال را برای علائمی که ممکن است به بیماری کووید-19 مربوط باشد غربالگری کنند، از جمله تب $\leq 100.4^\circ$ یا احساس تب (لرز، عرق کردن)، سرفه جدید (متفاوت از سرفه عادی)، تنگی نفس، درد عضلانی یا بدن درد؛ اسهال یا استفراغ؛ از دست دادن ناگهانی حس چشایی یا بویایی. **اگر علائم کارمند در بالا ذکر نشده اما همچنان نگرانی وجود دارد، ارزیابی تکمیلی توسط یک ارائه دهنده خدمات پزشکی توصیه می‌شود.**

مسیرهای تصمیم‌گیری برای مخاطبین کارمند¹ بالقوه مبتلا

در یک مؤسسه آموزشی

¹ یک کارمند بالقوه مبتلا کارمندیست که دارای 1 یا تعداد بیشتری از علائم مشابه با ابتلای احتمالی به عفونت کووید-19 است. علائم عبارتند از تب $100.4 \text{ }^\circ\text{F} \leq$ یا احساس تب (لرز، عرق کردن)، سرفه جدید (متفاوت از سرفه عادی)، تنگی نفس، درد عضلانی یا بدن درد؛ اسهال یا استفراغ؛ از دست دادن ناگهانی حس چشایی یا بویایی.

مخاطب کارمند بالقوه مبتلا، کودک یا کارمندی در مجموعه است که در تماس نزدیک با کارمند بالقوه مبتلا بوده (در یک بازه زمانی 24 ساعته مجموعاً 15 دقیقه یا بیشتر در فاصله 6 فوتی وی بوده) یا با مایعات بدن/ترشحات کارمند بالقوه مبتلا تماس مستقیم داشته؛ یا عضو کلاس یا گروه هم دوره‌ای می‌باشد که در معرض کارمند مبتلا قرار داشته است.



² مواجهه تأیید می‌شود مشروط به آنکه مؤسسه اطلاعیه‌ای دریافت کند که تست تشخیصی ویروسی کووید-19 کارمند بالقوه مبتلا مثبت شده است یا ارائه دهنده خدمات پزشکی ابتلای او به عفونت کووید-19 را تشخیص داده است.

مسیرهای تصمیم‌گیری برای

کودکان و کارمندان دارای تأیید آزمایشگاهی ابتلا به عفونت کووید-19

در یک مؤسسه آموزشی مخاطبین نزدیک آنان در مجموعه

راهنمای کودک یا کارمند دارای تأیید آزمایشگاهی ابتلا به عفونت کووید-19 در یک مؤسسه آموزشی

مؤسسه آموزشی در خصوص وجود کودک یا کارمند دارای تأیید آزمایشگاهی ابتلا به عفونت کووید-19 مطلع می‌شود.

کودک یا کارمند دارای تأیید آزمایشگاهی ابتلا به عفونت کووید-19 به خانه فرستاده می‌شوند.

به کودک یا کارمند دارای تأیید آزمایشگاهی ابتلا به عفونت کووید-19 ابلاغ می‌شود که در خانه، به دور از دیگران، قرنطینه شوند.¹

مؤسسه، مخاطبینی که حین واگرداری کودک یا کارمند دارای تأیید آزمایشگاهی ابتلا به عفونت کووید-19، در معرض آنان قرار گرفته‌اند را شناسایی کرده² و به مخاطبین در معرض ابتلا اطلاع رسانی می‌کند.

¹ افراد دارای تأیید آزمایشگاهی ابتلا به عفونت کووید-19 باید قرنطینه شوند تا زمانی که به مدت 24 ساعت دچار تب نشده باشند، علائم آنان بهبود یافته باشد و 10 روز از آغاز بروز علائم (یا اگر علائمی ندارند، 10 روز از تاریخ انجام آزمایش) سپری شده باشد.

² دوره واگرداری فرد مبتلا از 48 ساعت قبل از بروز علائم (یا تاریخ انجام آزمایش افراد فاقد علائم) تا زمانی که دیگر نیازی به ایزوله فرد مبتلا نباشد، محاسبه می‌شود.

مسیرهای تصمیم‌گیری برای مخاطبین¹ کودک یا کارمند دارای تأیید آزمایشگاهی ابتلا به عفونت کووید-19 در یک مؤسسه آموزشی.

¹ مخاطب یک کودک یا کارمند دارای تأیید آزمایشگاهی ابتلا به عفونت کووید-19، کودک یا کارمندی در مجموعه است که در یک بازه زمانی 24 ساعته، مجموعاً 15 دقیقه یا بیشتر در فاصله 6 فوتی از فرد دارای تأیید آزمایشگاهی ابتلا به عفونت کووید-19 بوده یا با مایعات بدن/ترشحات فرد دارای تأیید آزمایشگاهی ابتلا به عفونت کووید-19، تماس مستقیم محافظت نشده داشته؛ یا عضو کلاس یا گروه هم دوره‌ای می‌باشد که در معرض فرد دارای تأیید آزمایشگاهی ابتلا به عفونت قرار داشته است.

به مخاطبین اطلاع داده می‌شود که در مجموعه در معرض عفونت کووید-19 قرار گرفته‌اند و به آنان ابلاغ می‌شود خود را قرنطینه کنند و برای عفونت کووید-19 آزمایش دهند.

مخاطب آزمایش داده

نتیجه تست تشخیصی ویروسی
کووید-19 مخاطب مثبت است

مخاطب اکنون مورد ابتلا محسوب شده و باید در خانه ایزوله شود تا زمانی که به مدت 24 ساعت، بدون استفاده از داروهای تب‌بر دچار تب نشده باشد، علائم بهبود یافته باشند و 10 روز از آغاز بروز علائم (یا اگر علائمی ندارد، 10 روز از تاریخ انجام آزمایش) سپری شده باشد

نتیجه تست تشخیصی ویروسی
کووید-19 مخاطب منفی است

مخاطب به مدت 10 روز از آخرین مواجهه با فرد مبتلا در خانه در قرنطینه می‌ماند.

مخاطب آزمایش نداده