


Алгоритм действий при проверке на наличие симптомов и риска заражения в центрах воспитания и образования детей младшего возраста и школах TK-12

Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес
Обновлено: 9/20/2021

Алгоритм действий для *детей* с симптомами

Алгоритм действий для детей с симптомами перед входом¹ в учебное заведение, независимо от статуса вакцинации

¹Если ребенку стало плохо в учебном заведении, поместите его в изолированную зону (физически удаленную от других людей, лучше – на открытом воздухе) и следуйте алгоритму действий, описанному ниже.



¹Симптомы, свойственные возможному заражению COVID-19 у детей, включают в себя: высокую температуру $\geq 100.4^{\circ}\text{F}$ (38°C); недавно возникший кашель (отличающийся от привычного); понос или рвоту. Если симптомы ребенка не являются симптомами, свойственными возможному заражению COVID-19, но все равно вызывают беспокойство, рекомендуется осмотр ребенка врачом.

Алгоритм действий для невакцинированных контактов потенциально зараженного ребенка¹ в учебном заведении

¹**Потенциально зараженный ребенок** – это ребенок с 1 или несколькими симптомами, свойственными возможному заражению COVID-19. Близкие **контакты потенциально зараженного ребенка** – это люди в заведении, которые находились менее чем в 6 футах (2 метрах) 15 минут или дольше в течение 24-часового периода с потенциально зараженным ребенком ИЛИ имели прямой контакт с жидкостями/выделениями организма потенциально зараженного ребенка.



²**Риск заражения** близкого контакта с потенциально зараженным ребенком является подтвержденным, если объект получает уведомление, что потенциально зараженный ребенок получил положительный результат диагностического вирусного анализа на COVID-19 ИЛИ врач поставил ему диагноз COVID-19.

Алгоритм действий для полностью вакцинированных контактов потенциально зараженного ребенка¹ в учебном заведении

¹Потенциально зараженный ребенок – это ребенок с 1 или несколькими симптомами, свойственными возможному заражению COVID-19. Близкие контакты потенциально зараженного ребенка – это люди в заведении, которые находились менее чем в 6 футах (2 метрах) 15 минут или дольше в течение 24-часового периода с потенциально зараженным ребенком ИЛИ имели прямой контакт с жидкостями/выделениями организма потенциально зараженного ребенка.



²Риск заражения близкого контакта с потенциально зараженным ребенком является подтвержденным, если объект получает уведомление, что потенциально зараженный ребенок получил положительный результат диагностического вирусного анализа на COVID-19 ИЛИ врач поставил ему диагноз COVID-19.

Алгоритм действий для *сотрудников* с симптомами

Алгоритм действий для сотрудников с симптомами перед входом¹ в учебное заведение, независимо от статуса вакцинации

¹Если сотруднику стало плохо в учебном заведении, поместите его в изолированную зону (физически удаленную от других людей, лучше – на открытом воздухе) и следуйте алгоритму действий, описанному ниже.



¹Симптомы, свойственные возможному заражению COVID-19 у взрослых: высокая температура $\geq 100.4^\circ$ (38°C) или жар (озноб, потливость); кашель; одышка; недавняя потеря вкуса или обоняния; усталость; насморк или заложенность носа; боль в мышцах или теле; головная боль; боль в горле; тошнота или рвота; понос. При наличии симптомов, не указанных в этом списке, которые вызывают беспокойство, рекомендуется пройти дополнительный осмотр у врача.

Алгоритм действий для невакцинированных контактов потенциально зараженного сотрудника¹ в учебном заведении


¹Потенциально зараженный сотрудник – это сотрудник с 1 или несколькими [симптомами, свойственными возможному заражению COVID-19](#).
Близкие контакты потенциально зараженного сотрудника – это люди в заведении, которые находились менее чем в 6 футах (2 метрах) 15 минут или дольше в течение 24-часового периода с потенциально зараженным сотрудником ИЛИ имели прямой контакт с жидкостями/выделениями организма потенциально зараженного сотрудника.



²**Риск заражения** близкого контакта с потенциально зараженным сотрудником является подтвержденным, если объект получает уведомление, что потенциально зараженный сотрудник получил положительный результат диагностического вирусного анализа на COVID-19 ИЛИ врач поставил ему диагноз COVID-19.

Алгоритм действий для полностью вакцинированных контактов потенциально зараженного сотрудника¹ в учебном заведении

¹Потенциально зараженный сотрудник – это сотрудник с 1 или несколькими симптомами, свойственными возможному заражению COVID-19.
Близкие контакты потенциально зараженного сотрудника – это люди в заведении, которые находились менее чем в 6 футах (2 метрах) 15 минут или дольше в течение 24-часового периода с потенциально зараженным сотрудником ИЛИ имели прямой контакт с жидкостями/выделениями организма потенциально зараженного сотрудника.



²**Риск заражения** близкого контакта с потенциально зараженным сотрудником является подтвержденным, если объект получает уведомление, что потенциально зараженный сотрудник получил положительный результат диагностического вирусного анализа на COVID-19 ИЛИ врач поставил ему диагноз COVID-19.

**Алгоритм действий по карантину для детей и персонала с *риском заражения* в
центрах воспитания и образования
детей младшего возраста и школах ТК-12**

Выявление риска заражения в учебном заведении – близких контактов подтвержденного случая заражения

Близкий контакт - это человек, который вступал в контакт с лицом, у которого было диагностировано заражение COVID-19 во время его заразного периода*, если произошло как минимум одно из следующего:

- Человек находился в пределах 6 футов (2 метров) от зараженного COVID-19 в общей сложности 15 минут или более в течение 24-часового периода;

ИЛИ

- Человек вступал в незащищенный контакт с жидкостями и/или выделениями организма лица, зараженного COVID-19. Например, на него кашляли или чихали, они пили из одной кружки или пользовались одними столовыми приборами, они целовались или он ухаживал за зараженным лицом без использования надлежащих средств защиты.
- Человек считается **заразным** и способным передавать вирус другим людям за 2 дня до первого появления симптомов и до окончания периода его самоизоляции (т.е. прошло 10 дней с момента первого появления симптомов И как минимум 24 часа с момента нормализации температуры И улучшения симптомов); ИЛИ если симптомов не было, за 2 дня до сдачи анализа с положительным результатом и в течение 10 дней после сдачи анализа.

ПРИМЕЧАНИЕ: человек не должен считаться близким контактом, если программа не обладает разумной уверенностью в том, что он соответствует вышеуказанному определению. Лица не должны считаться близкими контактами только потому, что они находились в одной классной комнате или школьной группе с зараженным человеком. Если программа не может определить, кто является близким контактом, ей следует связаться с Департаментом общественного здравоохранения для получения технической помощи.

Для детей с риском заражения*: как долго соблюдать карантин?



*Согласно [руководству по домашнему карантину](#) Департамента общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес **Измененный карантин применим только к учащимся школы ТК-12 с риском заражения в школе.

Для сотрудников с риском заражения*: как долго соблюдать карантин?



Следите за появлением симптомов до 14-го дня

* Согласно [руководству по домашнему карантину](#) Департамента общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес, которое позволяет сотрудникам вернуться к работе, как только они завершили карантин, что может произойти до того, как они удовлетворят [критерии Cal/OSHA для возвращения к работе](#).