

مسارات اتخاذ القرارات بشأن **الأعراض والحجر الصحي** في مراكز الرعاية والتعليم المبكر
ومدارس الصفوف من مرحلة رياض الأطفال الانتقالية إلى المرحلة الثانوية


إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس

آخر تحديث: 2022/5/1

مسارات اتخاذ القرارات *للأطفال* الذين يعانون من أعراض

مسارات اتخاذ القرارات للأطفال الذين يعانون من أعراض قبل دخول *مؤسسة تعليمية، بغض النظر عن حالة التطعيم أو وضع الجرعة المعززة

* إذا شعر الطفل بالتعب في المنشأة، يجب وضعه في منطقة عزل (يفضل أن تكون في الهواء الطلق بعيدًا جسديًا عن يرافقه) مع اتباع مسارات القرارات الموضحة أدناه.



¹ تشمل الأعراض التي تدل على احتمال عدوى كوفيد-19 لدى الأطفال ما يلي: حمى $\leq 100.4^\circ$ درجة فهرنهايت؛ سعال جديد (غير عن معتاد)؛ الإسهال أو القيء. إذا كانت أعراض الطفل لا تدل على عدوى كوفيد-19 محتملة، لكن لا يزال هناك قلق، يوصى بأن يقيم مقدم رعاية طبية حالة الطفل.² الاختبار: اختبار كوفيد-19 الفيروسي التشخيصي، ويشمل هذا اختبار تضخيم الحمض النووي (مثل اختبار "بي سي آر" (المسحة)) أو اختبار المستضد الذي تؤخذ عينته ويُجرى في بيئة رعاية صحية أو موقع اختبار معتمد، أو يمكن استخدام اختبار بدون وصفة طبية مرخص من إدارة الغذاء والدواء. عند استخدام اختبار بدون وصفة طبية وكانت النتيجة إيجابية، يجب افتراض أن الفرد مصاب بكوفيد-19 ويجب أن يتبع إرشادات العزل المنزلي.

مسارات اتخاذ القرارات للمخالطين غير المعفيين* من الحجر الصحي لطفل يحتمل إصابته بالعدوى وتظهر عليه أعراض تدل على إصابة محتملة بكوفيد-19**

* غير المعفيين من الحجر الصحي هم (1) المخالطون غير المحصنين بالكامل أو (2) المخالطين المحصنين بالكامل المؤهلين للجرعة المعززة لكنهم لم يتلقوها بعد.


** مخالطو الطفل المحتمل إصابته بالعدوى ويعاني من أعراض تدل على إصابة محتملة بكوفيد-19¹ هم الأشخاص في المنشأة الذين كانوا على بعد 6 أقدام عن طفل يظهر عليه ≤ 1 من الأعراض الدالة على الإصابة بكوفيد-19 لمدة ≤ 15 دقيقة خلال 24 ساعة أو لامسوا سوائله / إفرازاته الجسدية ملامسة مباشرة.



¹ تشمل الأعراض التي تدل على احتمال عدوى كوفيد-19 لدى الأطفال ما يلي: حمى ≤ 100.4 درجة فهرنهايت؛ سعال جديد (غير عن معتاد)؛ الإسهال أو القيء. إذا كانت أعراض الطفل لا تدل على عدوى كوفيد-19 محتملة، لكن لا يزال هناك قلق، يوصى بأن يقيم مقدم رعاية طبية حالة الطفل. ² تتأكد المخالطة لمخالط طفل يحتمل إصابته بالعدوى إذا تلقى الموقع إشعارًا بأن نتيجة الطفل في اختبار كوفيد-19 التشخيصي الفيروسي إيجابية أو شخص مقدم رعاية طبية حالته بأنها إصابة بكوفيد-19. ³ ينطبق الحجر الصحي المعدل فقط على طلاب مدارس الصفوف من رياض الأطفال إلى الثانوية العامة. ⁴ الاختبار: اختبار كوفيد-19 الفيروسي التشخيصي، ويشمل هذا اختبار تضخيم الحمض النووي (مثل اختبار "بي سي آر" (المسحة)) أو اختبار المستضد الذي تؤخذ عينته ويجرى في بيئة رعاية صحية أو موقع اختبار معتمد، أو يمكن استخدام اختبار بدون وصفة طبية مرخص من إدارة الغذاء والدواء. عند استخدام اختبار بدون وصفة طبية وكانت النتيجة إيجابية، يجب افتراض أن الفرد مصاب بكوفيد-19 ويجب أن يتبع إرشادات العزل المنزلي.

مسارات اتخاذ القرارات للمخالطين المعفيين* من الحجر الصحي لطفل يحتمل إصابته بالعدوى وتظهر عليه أعراض تدل على إصابة محتملة بكوفيد-19**

* المعفيون من الحجر الصحي هم (1) المخالطون الذين تلقوا الجرعة المعززة أو (2) المخالطين المحصنين بالكامل غير المؤهلين بعد للجرعة المعززة.
** مخالطو الطفل المحتمل إصابته بالعدوى ويعاني من أعراض تدل على إصابة محتملة بكوفيد-19¹ هم الأشخاص في المنشأة الذين كانوا على بعد 6 أقدام عن طفل يظهر عليه $1 \leq$ من الأعراض الدالة على الإصابة بكوفيد-19 لمدة $15 \leq$ دقيقة خلال 24 ساعة أو لامسوا سوائله / إفرازاته الجسدية ملامسة مباشرة.




¹ تشمل الأعراض التي تدل على احتمال عدوى كوفيد-19 لدى الأطفال ما يلي: حمى $\leq 100.4^\circ$ درجة فهرنهايت؛ سعال جديد (غير عن معتاد)؛ الإسهال أو القيء. إذا كانت أعراض الطفل لا تدل على عدوى كوفيد-19 محتملة، لكن لا يزال هناك قلق، يوصى بأن يقيم مقدم رعاية طبية حالة الطفل. ² تتأكد المخالطة لمخالط طفل يحتمل إصابته بالعدوى إذا تلقى الموقع إشعارًا بأن نتيجة الطفل في اختبار كوفيد-19 التشخيصي الفيروسي إيجابية أو شخص مقدم رعاية طبية حالته بأنها إصابة بكوفيد-19. ³ الاختبار: اختبار كوفيد-19 الفيروسي التشخيصي، ويشمل هذا اختبار تضخيم الحمض النووي (مثل اختبار "بي سي آر" (المسحة)) أو اختبار المستضد الذي تؤخذ عينته ويجرى في بيئة رعاية صحية أو موقع اختبار معتمد، أو يمكن استخدام اختبار بدون وصفة طبية مرخص من إدارة الغذاء والدواء. عند استخدام اختبار بدون وصفة طبية وكانت النتيجة إيجابية، يجب افتراض أن الفرد مصاب بكوفيد-19 ويجب أن يتبع إرشادات العزل المنزلي. ⁴ يجب ألا يرتدي بعض الأشخاص الكمامات، مثل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 24 شهرًا. يجب على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 2 إلى 8 سنوات ارتداء الكمامة فقط تحت إشراف الكبار. انظر من لا يجب عليه ارتداء الكمامة واعتبارات خاصة لمن يعانون من صعوبات في التواصل أو إعاقات معينة.

مسارات اتخاذ القرارات *للموظفين* الذين يعانون من أعراض

مسارات اتخاذ القرارات للموظفين الذين تظهر عليهم أعراض قبل دخول* مؤسسة تعليمية بصرف النظر عن حالة التطعيم أو وضع الجرعة المعززة

* إذا شعر الموظف بالتعب في المنشأة، يجب وضعه في منطقة عزل (يفضل أن تكون في الهواء الطلق بعيدًا جسديًا عن من يرافقه) مع اتباع مسارات القرارات الموضحة أدناه.




¹ تشمل الأعراض المرتبطة بعدوى كوفيد-19 المحتملة لدى البالغين ما يلي: حمى $\leq 100.4^\circ$ درجة فهرنهايت أو الشعور بالحمى (قشعريرة وتعرق)؛ السعال؛ ضيق التنفس؛ فقدان جديد لحاسة التذوق أو الشم؛ التعب؛ الرشح أو احتقان الأنف؛ آلام العضلات أو الجسم؛ الصداع؛ التهاب الحلق؛ الغثيان أو القيء؛ الإسهال. إذا لم تكن الأعراض ضمن ما سبق ذكره، ولكن لا يزال هناك قلق، يوصى بإجراء تقييم إضافي لدى مقدم رعاية طبية. ² الاختبار: اختبار كوفيد-19 الفيروسي التشخيصي، ويشمل هذا اختبار تضخيم الحمض النووي (مثل اختبار "بي سي آر" (المسحة)) أو اختبار المستضد الذي تؤخذ عينته ويُجرى في بيئة رعاية صحية أو موقع اختبار معتمد، أو يمكن استخدام اختبار بدون وصفة طبية مرخص من إدارة الغذاء والدواء. عند استخدام اختبار بدون وصفة طبية وكانت النتيجة إيجابية، يجب افتراض أن الفرد مصاب بكوفيد-19 ويجب أن يتبع إرشادات العزل المنزلي.

مسارات اتخاذ القرارات للمخالطين غير المعفيين * من الحجر الصحي لموظف يحتمل إصابته بالعدوى وتظهر عليه أعراض تدل على إصابة محتملة بكوفيد-19**

* غير المعفيين من الحجر الصحي هم (1) المخالطون غير المحصنين بالكامل أو (2) المخالطين المحصنين بالكامل المؤهلين للجرعة المعززة لكنهم لم يتلقوها بعد.


** مخالطو الموظف المحتمل إصابته بالعدوى ويعاني من أعراض تدل على إصابة محتملة بكوفيد-19¹ هم الأشخاص في المنشأة الذين كانوا على بعد 6 أقدام عن موظف يظهر عليه ≤ 1 من الأعراض الدالة على الإصابة بكوفيد-19 لمدة ≤ 15 دقيقة خلال 24 ساعة أو لامسوا سوائله / إفرازاته الجسدية ملامسة مباشرة.



¹ تشمل الأعراض التي تدل على احتمال عدوى كوفيد-19 لدى الأطفال ما يلي: حمى ≤ 100.4 درجة فهرنهايت؛ سعال جديد (غير عن معتاد)؛ الإسهال أو القيء. إذا كانت أعراض الطفل لا تدل على عدوى كوفيد-19 محتملة، لكن لا يزال هناك قلق، يوصى بأن يقيم مقدم رعاية طبية حالة الطفل. ² تتأكد المخالطة لمخالط طفل يحتمل إصابته بالعدوى إذا تلقى الموقع إشعارًا بأن نتيجة الطفل في اختبار كوفيد-19 التشخيصي الفيروسي إيجابية أو شخص مقدم رعاية طبية حالته بأنها إصابة بكوفيد-19. ³ ينطبق الحجر الصحي المعدل فقط على طلاب مدارس الصفوف من رياض الأطفال إلى الثانوية العامة. ⁴ الاختبار: اختبار كوفيد-19 الفيروسي التشخيصي، ويشمل هذا اختبار تضخيم الحمض النووي (مثل اختبار "بي سي آر" (المسحة)) أو اختبار المستضد الذي تؤخذ عينته ويجرى في بيئة رعاية صحية أو موقع اختبار معتمد، أو يمكن استخدام اختبار بدون وصفة طبية مرخص من إدارة الغذاء والدواء. عند استخدام اختبار بدون وصفة طبية وكانت النتيجة إيجابية، يجب افتراض أن الفرد مصاب بكوفيد-19 ويجب أن يتبع إرشادات العزل المنزلي.

مسارات اتخاذ القرارات للمخالطين المعفيين * من الحجر الصحي لموظف يحتمل إصابته بالعدوى وتظهر عليه أعراض تدل على إصابة محتملة بكوفيد-19**

* المعفيون من الحجر الصحي هم (1) المخالطون الذين تلقوا الجرعة المعززة أو (2) المخالطين **المحصنين بالكامل** غير المؤهلين بعد للجرعة المعززة.
** مخالطو الموظف المحتمل إصابته بالعدوى ويعاني من أعراض تدل على إصابة محتملة بكوفيد-19¹ هم الأشخاص في المنشأة الذين كانوا على بعد 6 أقدام عن موظف يظهر عليه ≤ 1 من **الأعراض الدالة على الإصابة بكوفيد-19** لمدة ≤ 15 دقيقة خلال 24 ساعة أو لامسوا سوائله / إفرازاته الجسدية ملامسة مباشرة.



¹ تشمل الأعراض التي تدل على احتمال عدوى كوفيد-19 لدى الأطفال ما يلي: حمى $\leq 100.4^\circ$ درجة فهرنهايت؛ سعال جديد (غير عن معتاد)؛ الإسهال أو القيء. إذا كانت أعراض الطفل لا تدل على عدوى كوفيد-19 محتملة، لكن لا يزال هناك قلق، يوصى بأن يقيم مقدم رعاية طبية حالة الطفل. ² تتأكد المخالطة لمخالط طفل يحتمل إصابته بالعدوى إذا تلقى الموقع إشعارًا بأن نتيجة الطفل في اختبار كوفيد-19 التشخيصي الفيروسي إيجابية أو شخص مقدم رعاية طبية حالته بأنها إصابة بكوفيد-19. ³ الاختبار: اختبار كوفيد-19 الفيروسي التشخيصي، ويشمل هذا اختبار تضخيم الحمض النووي (مثل اختبار "بي سي آر" (المسحة)) أو اختبار المستضد الذي تؤخذ عينته وتُجرى في بيئة رعاية صحية أو موقع اختبار معتمد، أو يمكن استخدام اختبار بدون وصفة طبية مرخص من إدارة الغذاء والدواء. عند استخدام اختبار بدون وصفة طبية وكانت النتيجة إيجابية، يجب افتراض أن الفرد مصاب بكوفيد-19 ويجب أن يتبع **إرشادات العزل المنزلي**. ⁴ يجب ألا يرتدي بعض الأشخاص الكمامات، مثل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 24 شهرًا. يجب على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 2 إلى 8 سنوات ارتداء الكمامة فقط تحت إشراف الكبار. انظر **من لا يجب عليه ارتداء الكمامة واعتبارات خاصة لمن يعانون من صعوبات في التواصل أو إعاقات معينة**.

مسارات اتخاذ قرارات **الحجر الصحي** للأطفال والموظفين المخالطين في مراكز الرعاية والتعليم المبكر ومدارس الصفوف من مرحلة رياض الأطفال الانتقالية إلى المرحلة الثانوية

تعريف المخالطة داخل المدرسة – المخالطون لحالة مؤكدة

المخالط شخص خالط مصابًا بكوفيد-19 خلال الفترة المعدية* إذا حدث واحد على الأقل مما يلي:

- كان الشخص على بعد 6 أقدام من مصاب بكوفيد-19 لمدة 15 دقيقة أو أكثر خلال 24 ساعة؛

أو

- لامس الشخص دون حماية سوائل أو إفرازات جسم مصاب بكوفيد-19. على سبيل المثال، تعرّض لرذاذ سعاله أو عطسه، أو تقاسما كوبًا للشرب أو أواني للأكل، أو قبّل أحدهما الآخر، أو قدّم الرعاية للمصاب دون ارتداء معدات الحماية المناسبة.

- يعتبر الشخص **معدّيًا** وقادرًا على نشر الفيروس للآخرين من يومين قبل ظهور الأعراض لأول مرة حتى انتهاء فترة العزل (أي مرت 10 أيام منذ ظهور الأعراض لأول مرة وعدم وجود حمى لمدة 24 ساعة على الأقل وتحسّن الأعراض)؛ أو، إذا لم تظهر الأعراض مطلقًا، من يومين قبل إجراء الاختبار الذي ظهرت نتيجته إيجابية حتى 10 أيام بعد إجراء هذا الاختبار.

ملاحظة: لا ينبغي اعتبار الشخص مخالطًا ما لم يتأكد البرنامج بشكل معقول من أن التعريف أعلاه ينطبق عليه. ولا ينبغي اعتبار الأشخاص مخالطين لمجرد تواجدهم في الفصل الدراسي أو المجموعة المدرسية نفسها مع مُصاب. إذا لم يتمكن البرنامج من تحديد المخالطين، يجب عليه الاتصال بالصحة العامة للحصول على المساعدة الفنية.

مسار الحجر الصحي للأطفال المخالطين¹

وجود اعراض عند الطفل

بغض النظر عن حالة التطعيم أو وضع الجرعة المعززة

استشر مقدم رعاية طبية لمزيد من التقييم

اتبع إرشادات الاستبعاد وفقًا لمسارات قرار إدارة الصحة العامة للأطفال المصابين بأعراض (انظر الصفحة 3)

لا يوجد أعراض عند الطفل

غير محصن بالكامل* أو محصن بالكامل ومؤهل للجرعة المعززة لكنه لم يتلقاها بعد* يشمل المصابين سابقًا بعدوى سارس-كوفيد-2

حاصل على الجرعة المعززة أو محصن بالكامل لكنه غير مؤهل بعد للجرعة المعززة

الحجر الصحي الروتيني يوصى بالاختبار بشدة²

ملاحظة: يجب على من سبقت إصابتهم بفيروس سارس-كوف-2 خلال آخر 90 يومًا الماضية إجراء اختبار المستضد

خيار الحجر الصحي المعدل للطلاب من رياض الأطفال-المرحلة الثانوية³ يجب إجراء الاختبار مرتين أسبوعيًا (الاختبار الأول فور المخالطة والاختبار الثاني في اليوم الخامس)³

لا يحتاج للحجر الصحي*

* بالنسبة لطلاب الصفوف من رياض الأطفال إلى الثانوية العامة، يلزم إجراء الاختبار في اليوم 5 (يوصى أيضًا بإجراء الاختبار فور المخالطة)²

في حالة عدم وجود اختبار، ينتهي الحجر الصحي بعد اليوم العاشر


إذا أخذت عينة الاختبار السلبي في اليوم 5 ينتهي الحجر الصحي بعد اليوم 5

يمكن للطلاب الذهاب إلى المدرسة للتعليم الشخصي، إلا أن عليهم بخلاف هذا الحجر الصحي في المنزل، إذا أخذت عينة اختبار ظهرت نتيجته سلبية في اليوم 5، ينتهي الحجر الصحي بعد اليوم 5

راقب الأعراض وقم بتفريقية الكمامة حتى اليوم 10⁴

¹ يتبع إرشادات الحجر الصحي المنزلي الصادرة عن إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس. ² الاختبار: اختبار كوفيد-19 الفيروسي التشخيصي، ويشمل هذا اختبار تضخيم الحمض النووي (مثل اختبار "بي سي آر" (المسحة)) أو اختبار المستضد الذي تؤخذ عينته وتُجرى في بيئة رعاية صحية أو موقع اختبار معتمد، أو يمكن استخدام اختبار بدون وصفة طبية مرخص من إدارة الغذاء والدواء. عند استخدام اختبار بدون وصفة طبية وكانت النتيجة إيجابية، يجب افتراض أن الفرد مصاب بكوفيد-19 ويجب أن يتبع إرشادات العزل المنزلي. ³ يسري الحجر الصحي المعدل على طلبة مدارس الصفوف من رياض الأطفال-المرحلة الثانوية الذين خالطوا مصابًا في المدرسة. تجد معايير الحجر الصحي المعدل في خطة إدارة المخالطة من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية. ⁴ يجب ألا يرتدي بعض الأشخاص الكمامات، مثل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 24 شهرًا. يجب على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 2 إلى 8 سنوات ارتداء الكمامة فقط تحت إشراف الكبار. انظر من لا يجب عليه ارتداء الكمامة واعتبارات خاصة لمن يعانون من صعوبات في التواصل أو إعاقات معينة.

مسار الحجر الصحي بالموظفين المخالطين¹



راقب الأعراض وقم بتلقيحة الكمامة حتى اليوم 10⁴



¹ يتبع توجيه الحجر المنزلي الصادر عن إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس، الذي يتيح للموظفين العودة بمجرد انتهاء الحجر الصحي، الذي قد يسبق وفائهم بما تنص عليه المعايير المؤقتة الطارئة للوقاية من كوفيد-19 الصادرة عن إدارة الصحة والسلامة المهنية في كاليفورنيا. ² الاختبار: اختبار كوفيد-19 الفيروسي التشخيصي، ويشمل هذا اختبار تضخيم الحمض النووي (مثل اختبار "بي سي آر" (المسحة)) أو اختبار المستضد الذي تؤخذ عينته ويجرى في بيئة رعاية صحية أو موقع اختبار معتمد، أو يمكن استخدام اختبار بدون وصفة طبية مرخص من إدارة الغذاء والدواء. عند استخدام اختبار بدون وصفة طبية وكانت النتيجة إيجابية، يجب افتراض أن الفرد مصاب بكوفيد-19 ويجب أن يتبع إرشادات العزل المنزلي. ⁴ يجب ألا يرتدي بعض الأشخاص الكمامات، مثل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 24 شهرًا. يجب على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 2 إلى 8 سنوات ارتداء الكمامة فقط تحت إشراف الكبار. انظر من لا يجب عليه ارتداء الكمامة واعتبارات خاصة لمن يعانون من صعوبات في التواصل أو إعاقات معينة.