



COVID-19 ワクチン – よくある質問

ブースター接種

本書、およびその他のワクチンに関するよくある質問のオンライン版は、[COVID-19 ワクチンのウェブページ](#)をご覧ください。

COVID-19ワクチンのブースター接種はどのような人に推奨されますか？

ブースター接種に対する推奨事項は、その人の年齢、初回接種のワクチンの種類、免疫不全症候群を持っているかなどによって異なります。ブースター接種を受ける時期が来たら、新しいワクチンが利用可能になるまで待つのではなく、今すぐブースター接種を受けることが勧められています。

COVID-19 に対する最大の効果を得るために、CDC は、ブースター接種の対象の場合、5 歳以上の全ての人が [COVID-19 ワクチンの初回接種を完了](#) した後にブースター接種を 1 回受けることを薦めています。特に：

- Pfizer、Moderna、または Johnson & Johnson (J&J) の COVID-19 ワクチンの初回接種を受けた 18 歳以上の方は、ブースター接種を 1 回受けることが **推奨**されています。
- Pfizer の初回接種を受けた 5 歳から 17 歳の子供はブースター接種を 1 回受けることが **推奨**されています。

注：生後 6 か月から 4 歳の子供向けの Pfizer 製 COVID-19 ワクチンと生後 6 か月から 17 歳向けの Moderna 製 COVID-19 ワクチンは、最近この年齢層向けに認証されたばかりなので、ブースター接種が必要かどうかはまだわかっていません。現在、初回接種に Novavax のワクチンを受けた人はブースター接種の対象とはなりません。

さらに、人によってはブースター接種を 2 回受けるべき人もいます。(以下の [どのような人が 2 回目のブースター接種の対象者となりますか?](#) を参照のこと)。

COVID-19 ワクチンのブースター接種受けることは、免疫機能を強化するために重要です。これにより、重症化、入院、さらには死亡に至ることを防ぎます。

詳細については、CDCの[COVID-19 ワクチンのブースター接種](#)をご覧ください。

ブースター接種を受ける対象者となるのはいつですか？

18歳以上の場合、ブースター接種の対象者となります。

- ModernaまたはPfizerワクチンの初回接種の最後の接種から5か月後、または
- Johnson & Johnson (J&J) ワクチンの単回接種から2か月後。

ブースター接種はどの種類のCOVID-19ワクチンでも接種可能ですが、Pfizer、ModernaまたはJ&J製のワクチンが推奨されています。

初回接種にPfizerワクチンを受けた5～17歳の子供は、以下の場合にPfizerブースター接種の対象となります：

- Pfizerワクチンの2回目接種から5か月後

中等度または重度の免疫不全症の方は、ブースター接種をより早く受ける必要があります。詳細については、CDCの「[中等度または重度の免疫不全症の方へのCOVID-19ワクチン接種](#)」をご覧ください。

接種時期がきているのに、まだ最初のブースター接種を受けていない場合は、今すぐブースター接種を受けましょう。

注：Novavaxのワクチンはブースター接種としての使用を認証されていません。CDCのインタラクティブな「[COVID-19 ワクチンのブースター接種を受ける](#)」ツールにアクセスして、あなた（またはお子様）



COVID-19 ワクチン – よくある質問

ブースター接種

がブースター接種を1回以上受けられるかどうかを判断するのにご活用ください。
質問がある場合は、かかりつけ医にご相談ください。

どのような人が2回目のブースター接種の対象者となりますか？

以下の方々、1回目のブースター接種から4か月以上経過している場合、2回目のCOVID-19ブースターを受ける対象となります。

- 50歳以上の方
- 12歳以上で中等度または重度の免疫不全症の方
- 18～49歳で、初回接種とブースター接種の両方でJ&Jワクチンの接種を受けた方

50歳以上の方、または12歳以上で中等度または重度の免疫不全症の方は（かつ1回目のブースター接種から4か月が経過している場合）、2回目のブースター接種を直ちに受けて、COVID-19ワクチン接種状況を最新の状態にしておく必要があります。COVID-19の発生率が上昇しており、ご自身がCOVID-19に感染すると、重症化するリスクが高くなることに注意することが重要です。

18～49歳で、初回接種とブースター接種の両方でJ&Jワクチンの接種を受けた方（かつ1回目のブースター接種から4か月が経過している場合）は、2回目のブースター接種を受けることができます。2回目のブースター接種は現在受けることが可能な接種を全て済ませているとみなされるために必要ではありません。COVID-19で発症リスクが高い方は、今すぐ2回目のブースター接種を受けましょう。あなたが健康で、他の人との接触が限られている場合は、ブースター接種を受ける時期を待つことを検討できます。

初回接種にNovavaxのワクチンを受けた方は、現在ブースター接種の対象にはなりません。

注：Novavaxのワクチンはブースター接種としての使用を認証されていません。詳細については、CDCの[COVID-19 ワクチンのブースター接種](#)をご覧ください。

CDCのインタラクティブな「[COVID-19 ワクチンのブースター接種を受ける](#)」ツールにアクセスして、あなた（またはお子様）が2回目のブースター接種の対象者であるかどうかを判断するのにご活用ください。

質問がある場合は、かかりつけ医にご相談ください。

ブースター接種を受けることによるリスクは何ですか？

ブースター接種を受けた後の反応は、初回接種後の反応と似ています。ほとんどの副反応は軽度から中等度で、2日以内には治まります。初回接種同様、深刻な副反応が起こることは稀です。詳細は、CDCの[COVID-19ワクチンの安全性](#)のウェブページをご覧ください。ブースター接種を受けることのベネフィットは、既知および潜在的なリスクを上回ります。

ブースター接種を受けるには、医師からの手紙や処方箋を提示する必要がありますか？

いいえ、ブースター接種を受けるために医師からの手紙や処方箋は必要ありません。対象者となる場合は、自己証明（自己報告）することができます。接種場所に行く際に、CDCのホワイトカードやデジタル予防接種記録などのワクチン接種の証明を持参しましょう。詳細は、公衆衛生局の[ワクチン接種を受ける方法](#)のウェブページをご覧ください。



COVID-19 ワクチン – よくある質問 ブースター接種



詳細情報はどこで入手できますか？



- この「よくある質問 (FAQ)」または他のCOVID-19ワクチン関連項目に関するよくある質問 (FAQ) を印刷または表示するには、QRコードを読み取るか、[COVID-19 ワクチンに関するよくある質問](#)にアクセスしてください。
- CDCのウェブページ [COVID-19ワクチンのブースター接種](#)
- [VaccinateLACounty.com](#) – 接種時期を示す図表付 [COVID-19 ワクチン接種のスケジュール](#)及び[ワクチン接種を受ける方法](#)を含む。
- 質問がある場合は医師に相談してください。