



新型コロナワクチン – よくあるご質問

免疫不全の方に関して



免疫力の低い人はなぜ、通常よりも多くの回数を接種する必要があるのですか？

中等度または重度の免疫低下（血液関連の癌や癌に対する特定の治療中、臓器移植をした、特定の自己免疫疾患があるなど）がみられる方は特に、新型コロナウイルス感染症にかかりやすいと言われております。このような方々は、正常な免疫システムを持つ人よりも新型コロナウイルスに感染する可能性が高く、感染した場合は重症化しやすく、他の人へのウイルス感染を広げる可能性が高いのです。

また免疫力が低い人の中には、新型コロナワクチンの一般的な初回接種を受けただけでは十分な免疫を得られない人もいます。このため、こういった人たちはより多くの回数のワクチン接種を受け、さらに、そのうちのいくつかをより短い間隔で接種することが推奨されます。

接種は何回受けるべきでしょうか？

あなたの年齢と初回接種のワクチンによって異なります。中等度、または重度の免疫低下が見られる方は、通常の接種回数に加えて COVID-19 の追加接種を 1 回受けることで **初回接種** を完了したとみなされます。つまり、合計で、

- Pfizer または Moderna 製ワクチンであれば 3 回の接種、または
- 単回接種の J&J 製ワクチンを受けた場合は、その後 Pfizer または Moderna 製ワクチンの接種を 1 回（J&J 製ワクチン接種を受ける場合は 18 歳以上でなければなりません）。
- 注：免疫不全症の方向けの Novavax の 3 回目初回接種は、現在認証されていません。

次の方は、ブースター接種を 1 回受けましょう：

- 初回接種に Pfizer の接種を受けた 5 歳から 11 歳の方。つまり合計で 4 回（初回接種 3 回とブースター接種 1 回）の接種を受けることになります。

次の方は、ブースター接種を 2 回受けましょう：

- Pfizer の接種を受けた 12 歳から 17 歳の方。つまり合計 5 回（初回接種 3 回とブースター接種 2 回）の接種を受けることになります。
- Pfizer か Moderna のワクチン接種を受けた 18 歳以上の方。つまり合計 5 回（初回接種 3 回とブースター 2 回）の接種を受けることになります。
- 初回接種に J&J のワクチン接種を受けた 18 歳以上の方。つまり合計 4 回（初回接種 2 回とブースター接種 2 回）の接種を受けることになります。

現在、ブースター接種は免疫不全症を持つ生後 6 か月から 4 歳までの子供や、Moderna のワクチン接種を受けた 5 歳から 17 歳の子供には推奨されていません。

CDC のインタラクティブな「[COVID-19 ワクチンのブースター接種を受ける](#)」ツールにアクセスして、あなた（またはお子様）がブースター接種の対象であるかどうかを判断するのにご活用ください。

追加接種やブースター接種の最適なタイミングについては、現在の治療計画に基づき担当医師とご確認ください。これは特に、免疫抑制治療の開始または再開を予定している場合に重要となります。

免疫不全の方に推奨される初回接種とブースター接種に関する情報は、公衆衛生局の ph.lacounty.gov/covidvaccineschedules に記載されている [新型コロナワクチン接種スケジュール](#) をご覧ください。



新型コロナワクチン – よくあるご質問 免疫不全の方に関して



ウイルスから自分を守るために、他にどんな手段を取ればよいのでしょうか？

新型コロナウイルスから身を守るためには、新型コロナワクチン接種を受けるだけでなく、他の手段も講じることが重要です。

- **新型コロナウイルス感染予防薬について、医師に相談しましょう。** ワクチンだけでは十分な免疫力をつけることができない方向けに、新型コロナウイルスへの感染を予防するEvusheldという薬が使用可能になりました。1回の診察中に、薬品を2回に分けて臀部に注射します。12歳以上で体重が88lb（およそ40kg）以上ある方に投与することが可能です。詳しくは、ph.lacounty.gov/covidmedicinesのウェブページを参照ください。
- より高い保護レベルで感染を防ぐために、隙間なくフィットする高性能マスク（N95、KN95、KF94等）や[マスクを二重にする](#)など、**保護効果の高いマスクを着用しましょう。** 屋内の混雑した場所や風通しの悪い場所ではできるだけ避けるようにしましょう。詳細はph.lacounty.gov/reducerisk および ph.lacounty.gov/masks をご参照ください。
- **あなた自身を守るために、周りの人たちにも接種を勧めましょう。** 周囲の人たちも、[現時点で受けられる新型コロナワクチンの接種を全て完了](#)し、対象者は [2回目のブースター接種](#)を受け、新型コロナウイルスへの感染リスク、さらには、あなたへ感染する[リスクを減らす](#)ために、その他の手段を講じる必要があります。

詳しい情報はどこで入手できますか？



- 本紙の「よくあるご質問」やその他の新型コロナワクチンに関する「よくあるご質問」を印刷または表示するには、QRコードを読み取るか、[新型コロナワクチンに関する「よくあるご質問」](#)をご覧ください。
- VaccinateLACounty.com – [新型コロナワクチン接種スケジュール](#)や、各接種時期を示すグラフィック、および[ワクチン接種方法](#)に関する情報が確認できます。
- 詳しくは、CDC ウェブページの「[中等度または重度の免疫力低下がみられる方の新型コロナワクチン接種について](#)」をご覧ください。
- 不明な点がある場合は、医師に相談してください。