



Вакцины от COVID-19 – Ответы на часто задаваемые вопросы ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИММУНОДЕФИЦИТОМ

Почему людям со слабой иммунной системой нужно больше доз вакцины?

Люди с умеренно или значительно ослабленной иммунной системой (например, с раком крови или проходящие определенные виды лечения раковых заболеваний, с пересадкой органов и определенными аутоиммунными состояниями) особенно подвержены заболеванию COVID-19. Они с большей вероятностью могут заразиться COVID-19, чем люди с нормальной иммунной системой. А если они заразятся, то с большей вероятностью тяжело заболеют и передадут вирус окружающим.

Кроме того, стандартная основная серия вакцины от COVID-19 не обеспечивает достаточной защитой некоторых людей со слабой иммунной системой. В связи с этим им рекомендовано привиться большим количеством доз вакцины, а также получить некоторые из этих доз в более короткий временной интервал.

Сколькими дозами вакцины следует привиться?

Это зависит от вашего возраста и вакцины основной серии. Если у вас умеренно или значительно ослабленная иммунная система, вам следует привиться дополнительной дозой вакцины от COVID-19 для завершения *основной серии*. Это означает в общей сложности:

- 3 дозы вакцины Pfizer или Moderna - ИЛИ –
- 1 доза вакцины J&J, а затем 1 доза вакцины Pfizer или Moderna (для прививки вакциной J&J вам должно быть 18 лет или больше).
- Примечание: 3-я доза основной серии вакцины Novavax для людей с иммунодефицитом в настоящее время не разрешена.

Вам следует привиться 1-й стимулирующей дозой, если:

- Вам 5-11 лет и вы привились вакциной Pfizer в рамках основной серии. Это означает в общей сложности 4 дозы (3 дозы основной серии + 1 стимулирующая доза).

Вам следует привиться 2-ми стимулирующими дозами, если:

- Вам 12-17 лет, и вы привились вакциной Pfizer. Это означает в общей сложности 5 доз (3 дозы основной серии + 2 стимулирующие дозы).
- Вам 18 лет и больше, и вы привились либо вакциной Pfizer, либо вакциной Moderna. Это означает в общей сложности 5 доз (3 дозы основной серии + 2 стимулирующие дозы).
- Вам 18 лет и больше, и вы привились вакциной J&J в качестве первой дозы. Это означает в общей сложности 4 дозы (2 дозы основной серии + 2 стимулирующие дозы).

Стимулирующие дозы в настоящее время не рекомендованы для детей с иммунодефицитом в возрасте от 6 месяцев до 4 лет включительно, а также для детей 5-17 лет, которые привились вакциной Moderna.

Воспользуйтесь интерактивным инструментом CDC «[Прививка стимулирующей дозой вакцины от COVID-19](#)», чтобы определить, когда вы (или ваш ребенок) можете привиться одной или несколькими стимулирующими дозами вакцины от COVID-19.

Узнайте у своего врача о наиболее подходящем времени для прививки дополнительной и/или стимулирующей дозой (или дозами) на основании вашего текущего плана лечения. Это особенно важно, если вы собираетесь начать или возобновить иммуносупрессивную терапию.

Для получения информации обо всех рекомендуемых основных и стимулирующих дозах для людей с иммунодефицитом ознакомьтесь с [графиком вакцинации от COVID-19](#) от DPH по адресу ph.lacounty.gov/covidvaccineschedules.



Вакцины от COVID-19 – Ответы на часто задаваемые вопросы ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИММУНОДЕФИЦИТОМ

Какие еще меры мне следует принять для защиты себя?

Вам важно принимать другие меры для защиты себя от COVID-19 помимо прививки вакциной от COVID-19:

- **Проконсультируйтесь со своим врачом о лекарственном препарате для профилактики COVID-19.** Препарат Evusheld доступен в настоящее время для профилактики заражения COVID-19 у людей, которые не могут получить достаточную защиту от одной только вакцины. Он вводится в ягодицы в виде 2 отдельных уколов единовременно. Он может быть введен людям 12 лет и старше весом не менее 88 фунтов (40 кг). Для получения дополнительной информации посетите веб-страницу ph.lacounty.gov/covidmedicines.
- **Носите защитную маску**, такую как плотно прилегающий респиратор (например, N95, KN95, KF94) или [двойную маску](#) для более высокого уровня защиты. По возможности избегайте многолюдных помещений или мест с плохой вентиляцией воздуха. Для получения дополнительной информации посетите ph.lacounty.gov/reducerisk и ph.lacounty.gov/masks.
- **Просите людей, с которыми вы проводите время, помочь защитить вас.** Им следует привиться [всеми необходимыми](#) дозами вакцины от COVID-19, привиться [2й стимулирующей дозой](#) при наличии права на ее получение и принимать другие меры для [снижения риска](#) заражения и передачи вам вируса COVID-19.

Где я могу получить дополнительную информацию?



- Чтобы распечатать или просмотреть эти ответы на часто задаваемые вопросы или ответы на часто задаваемые вопросы на другие темы, связанные с вакциной от COVID-19, отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке «[Ответы на часто задаваемые вопросы по вакцине от COVID-19](#)».
- VaccinateLACounty.com, включая [график вакцинации от COVID-19](#) с изображениями, показывающими, когда необходимо привиться каждой дозой, и информацию о том, [как привиться вакциной](#).
- Для получения дополнительной информации посетите веб-страницу CDC «[Вакцины от COVID-19 для людей с умеренным или сильным иммунодефицитом](#)».
- Если у вас есть вопросы, проконсультируйтесь со своим врачом.