



COVID-19 疫苗 – 常见问题 (FAQ)

适用于免疫功能受损者



为什么免疫系统薄弱者需要接种更多的剂量？

免疫系统中度或严重受损者（如患有与血液相关的癌症或正在接受特定的癌症治疗，接受了器官移植，患有某些自身免疫性疾病的个人）尤其容易受到 COVID-19 的侵害。他们比免疫系统正常者更容易感染 COVID-19。如果感染了 COVID-19，他们更有可能病得很重，并将病毒传播给其他人。

此外，一些免疫系统薄弱的个人在接种标准的 COVID-19 初始系列疫苗剂量后，不会获得足够的保护。正因如此，建议他们接种更多剂量的疫苗，并在更短的时间间隔内接种其中的一些剂量。

我应该接种多少剂疫苗？

这取决于你的年龄和接种的初始系列疫苗。如果你的免疫系统中度或严重受损，你应该接种额外一剂 COVID-19 疫苗，来完成你的 初始系列疫苗 的接种。这意味着总共：

- 接种三剂辉瑞或莫德纳疫苗 – 或 –
- 一剂强生疫苗，以及一剂辉瑞或莫德纳疫苗（你必须在 18 岁或以上才能接种强生疫苗）。
- 注意：适用于免疫功能受损者的第三剂诺瓦瓦克斯 (Novavax) 初始系列疫苗目前未获得授权。

如果你属于以下情况，则应接种一剂加强剂疫苗：

- 是 5-11 岁之间的儿童，并且已接种的初始系列疫苗是辉瑞疫苗。这意味着你总共需接种 4 剂疫苗（3 剂初始系列疫苗+1 剂加强剂疫苗）。

如果你属于以下情况，则应接种两剂加强剂疫苗：

- 你的年龄处于 12-17 岁之间，且接种了辉瑞疫苗。这意味着你总共需接种 5 剂疫苗（3 剂初始系列疫苗+2 剂加强剂疫苗）。
- 你的年龄为 18 岁及以上，且已接种辉瑞或莫德纳疫苗。这意味着你总共需接种 5 剂疫苗（3 剂初始系列疫苗+2 剂加强剂疫苗）。
- 你的年龄为 18 岁及以上，且初始剂量接种的是强生疫苗。这意味着你总共需接种 4 剂疫苗（2 剂初始系列疫苗+2 剂加强剂疫苗）。

目前，不建议免疫功能受损的 6 个月至 4 岁儿童，或已接种莫德纳疫苗的 5-17 岁儿童接种加强剂疫苗。

请访问美国疾病控制与预防中心(CDC)的互动式“[接种 COVID-19 疫苗加强剂](#)”工具，以帮助确定你（或你的孩子）何时可以接种一剂或更多 COVID-19 疫苗加强剂。

向你的医生询问根据你目前的治疗计划，接种额外剂和/或加强剂疫苗的最佳时机。如果你即将开始或重新开始免疫抑制治疗，这一点尤为重要。

请参阅公共卫生局网页 ph.lacounty.gov/covidvaccineschedules 上的 [COVID-19 疫苗接种时间表](#)，了解所有适用于免疫功能受损者的建议接种的初始和加强剂量疫苗。



COVID-19 疫苗 – 常见问题 (FAQ)

适用于免疫功能受损者



我还应该采取哪些措施来保护自己？

除了接种COVID-19疫苗外，采取其他措施保护自己免于感染COVID-19也很重要：

- 咨询你的医生，了解有关预防COVID-19的药物。目前，一种名为Evusheld的药物可用于让仅靠接种疫苗无法产生足够保护效果的个人免于感染COVID-19。给药方式是一次进行两针臀部注射。它的适用对象包括12岁及以上且体重至少为88磅的个人。有关更多信息，请参阅网页：ph.lacounty.gov/covidmedicines。
- 佩戴具有防护性的口罩，例如贴合面部的呼吸器（如 N95、KN95、KF94）或佩戴[双层口罩](#)，以加强防护效果。尽量避免前往人群拥挤的室内区域或空气流通不畅的地点。欲了解更多详情，请参阅 ph.lacounty.gov/reducerisk 和 ph.lacounty.gov/masks。
- 鼓励和你在一起的人帮助保护你的健康。他们应该[保持最新的](#) COVID-19 疫苗接种状态，并且若符合条件，接种[第二剂加强剂](#)疫苗，以及采取其他措施，减少他们感染和传播 COVID-19 给你的[风险](#)。

我在哪里可以获得更多的信息？



- 如需打印或查看本常见问题或其他关于COVID-19疫苗主题的常见问题，请扫描二维码或访问[COVID-19疫苗常见问题\(FAQ\)](#)。
- VaccinateLACounty.com – 包括[COVID-19疫苗接种时间表](#)，其中有图表显示应接种每一剂疫苗的时间，以及[如何接种疫苗](#)的信息。
- 欲了解更多信息，请参阅美国疾病控制与预防中心 (CDC) 的网页：“[适用于中度或重度免疫功能受损者的 COVID-19 疫苗](#)”。
- 如果你有任何问题，请咨询你的医生。

