

دوز تکمیلی برای افرادی دارای سیستم ایمنی تضعیف شده (دارای نقص ایمنی)



احتمال آنکه افراد دارای سیستم‌های ایمنی تضعیف شده به کووید-19 مبتلا شوند، بیشتر از افراد دارای سیستم ایمنی طبیعی است. و اگر آلوده شوند، احتمالش بیشتر است که به شدت بیمار شوند و ویروس را به سایر افراد در خانه‌شان سرایت دهند. مطالعات نشان داده است که برخی افراد مبتلا به نقص ایمنی پس از دریافت 2 دوز از واکسن Moderna یا Pfizer، حفاظت کافی در آنها ایجاد نمی‌شود.

به این دلیل، CDC توصیه می‌کند که افراد دارای نقص ایمنی متوسط تا شدید، یک دوز تکمیلی دریافت کنند. این شامل افرادی است که:

- تحت معالجه سرطان فعال تومورها یا سرطان‌های خون قرار دارند
- پیوند عضو دریافت کرده‌اند و برای سرکوب سیستم ایمنی بدن خود دارو مصرف می‌کنند
- طی 2 سال گذشته پیوند سلول بنیادی دریافت کرده‌اند یا برای سرکوب سیستم ایمنی دارو مصرف می‌کنند
- مراحل اولیه نقص ایمنی متوسط یا شدید (مانند سندرم دی جرج، سندرم ویسکوت-آلدریچ)
- عفونت HIV پیشرفته یا درمان‌نشده



• درمان فعال با دوز بالای کورتیکواستروئید یا داروهای دیگری که ممکن است واکنش ایمنی را سرکوب کنند

در مورد دریافت یک دوز تکمیلی واکسن کووید-19 با پزشک خود صحبت کنید. در صورت نیاز به دریافت دوز سوم، درباره بهترین زمان بندی بر مبنای طرح درمان کنونی خود سؤال کنید. این موضوع به‌ویژه زمانی که در شرف آغاز یا شروع مجدد درمان سرکوب سیستم ایمنی هستید، اهمیت می‌یابد.

شما همچنین باید بدانید:

- دوز سوم واکسن mRNA (Moderna یا Pfizer) باید حداقل 28 روز پس از دوز دوم تزریق شود.
- در صورت امکان باید از همان نوع واکسن استفاده شود. به عنوان مثال، اگر Pfizer دریافت کرده‌اید، سعی کنید برای دوز سوم خود نیز Pfizer دریافت کنید.
- برای کسانی که واکسن Johnson & Johnson را دریافت کرده‌اند، در حال حاضر دریافت دوز تکمیلی توصیه نمی‌شود. FDA همچنان در حال ارزیابی داده‌های مربوط به اثربخشی این واکسن در افراد مبتلا به نقص ایمنی است.

