



ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ วัคซีนโควิด-19

ทำไมต้องได้รับการฉีดวัคซีน

- วัคซีนโควิด-19 **มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ**
- การฉีดวัคซีนเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณและคนที่คุณรักปลอดภัยจากการป่วย การขาดงาน รวมถึงการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิต
- วัคซีนจะปกป้องคุณจากโควิดสายพันธุ์เดลต้าและยังช่วยลดโอกาสที่จะเจอกับสายพันธุ์ใหม่ที่อันตรายกว่าด้วย



ใครสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้บ้าง

ผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป

- ฉีดวัคซีนให้ **ฟรี** สำหรับทุกคน แม้ว่าคุณจะไม่มึ่ประกันสุขภาพก็ตาม
- คุณมีสิทธิได้รับวัคซีน และจะไม่มี การสอบถามถึงสถานะการเข้าเมืองของคุณ
- ผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป แนะนำให้เข้ารับการฉีดวัคซีน ซึ่งรวมถึงหญิงตั้งครรภ์หรือหญิงให้นมบุตร และผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาแล้ว
- ผู้ที่เป็นภูมิแพ้สามารถรับวัคซีนได้



วิธีการฉีดวัคซีน

มีสถานที่ที่กว้างร้อยแห่งทั่วมณฑลลอสแอนเจลิสส่วนมากเปิดช่วงวันหยุดและช่วงเย็น ไม่จำเป็นต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า


ค้นหาสถานที่ใกล้บ้านของคุณ:

- ไปที่ **VaccinateLACounty.com** หรือโทรหาศูนย์รับเรื่องวัคซีน (Vaccine Call Center) ที่หมายเลข **833-540-0473** ศูนย์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.30 น.
- คุณสามารถโทรไปยัง 2-1-1 ที่จะให้ข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมงในทุกวัน หรือสอบถามแพทย์ของคุณ หรือเภสัชกรใกล้บ้านคุณ
- บริการรถขนส่งฟรีเพื่อนำคุณไปยังศูนย์ฉีดวัคซีน


เยาวชนจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนรับการฉีดวัคซีน

วัคซีนใดบ้างที่พร้อมให้บริการ


Pfizer
สำหรับ: ผู้ที่อายุ 12 ปีขึ้นไป
ฉีดจำนวน: 2 โดส – ห่างกัน 21 วัน



Moderna
ผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป
2 โดส - ห่างกัน 28 วัน



Johnson & Johnson
ผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป
1 โดส



หากคุณมีระดับภูมิคุ้มกันปานกลางหรืออ่อนแออย่างมาก คุณอาจจะจำเป็นต้องรับวัคซีนเพิ่ม ให้ปรึกษาแพทย์



ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ วัคซีนโควิด-19

ผลข้างเคียงมีอะไรบ้าง

- ผลข้างเคียงที่เกิดจากวัคซีนเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไป ได้แก่ อาการปวดหรือแดงที่แขน รู้สึกเหนื่อย มีไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ หรือปวดกล้ามเนื้อ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีอาการเช่นนี้
- ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าระบบภูมิคุ้มกันของคุณ **กำลังสร้างการปกป้องร่างกาย** โดยอาการเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกิจกรรมประจำวันของคุณ แต่อาการควรหายเองภายใน 1 หรือ 2 วันหลังรับวัคซีน
- ผลข้างเคียงที่รุนแรงอาจเกิดขึ้นได้ แต่พบได้น้อยมาก



วัคซีนปลอดภัยเพียงใด

- คุณจะไม่ได้รับเชื้อโควิด-19 จากวัคซีน ไม่มีวัคซีนใดมีไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19
- วัคซีนผ่านการทดสอบในผู้คนหลายหมื่นคน ซึ่งรวมถึงคนผิวสี ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีอาการป่วยต่างๆ และเราพบว่าวัคซีนปลอดภัย
- มีการปฏิบัติตามทุกขั้นตอนที่กำหนดเพื่อให้มั่นใจว่าวัคซีนนั้น **ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ**
- ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2020 **ผู้คนหลายล้านคน**ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 **อย่างปลอดภัย**
- ไม่มีหลักฐานว่าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทำให้เกิดภาวะเป็นหมัน และข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดจนถึงปัจจุบันสำหรับการฉีดวัคซีนให้กับหญิงตั้งครรภ์ยืนยันแล้วว่าวัคซีนปลอดภัย นักวิทยาศาสตร์ศึกษาผลข้างเคียงของวัคซีนโควิด-19 อย่างต่อเนื่องด้วยความระมัดระวัง และเปิดเผยข้อมูลที่ทราบจากการวิจัยให้เราทราบ



หลังฉีดวัคซีน

- จะไม่ถือว่าคุณได้**ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว**จนกว่าจะฉีดวัคซีน Johnson & Johnson ไปแล้ว 2 สัปดาห์ หรือหลังจากที่คุณฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ของ Pfizer หรือ Moderna เนื่องจากร่างกายคุณจำเป็นต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกัน
- หลังจากที่คุณฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว ในหลายสถานการณ์คุณยังจำเป็นต้องปกป้องตนเองและผู้อื่นอยู่:
 - สวมใส่หน้ากากที่เหมาะสม
 - เมื่อป่วยให้อยู่บ้าน
 - ล้างมือบ่อยๆ
 - หลีกเลี่ยงสถานที่ที่แออัดและมีอากาศไหลเวียนต่ำ
 - รักษาระยะห่าง

