

لقاحات كوفيد-19

ما يجب على أولياء الأمور معرفته



هل يمكن أن يتلقى طفلي لقاح كوفيد؟

يمكن أن يتلقى الأطفال من عمر 12 عامًا لقاح **فايزر**.

- اللقاحات مجانية للجميع.
- لا تحتاج إلى أن يكون لديك تأمين.
- لن تُطرح عليك أي أسئلة عن الوضع القانوني لإقامتك.
- يمكن أن يتلقى الجميع اللقاح، بمن فيهم معظم المصابين بالحساسية.



مجانية

هل يجب أن أجعل طفلي يتلقى لقاح كوفيد-19؟

- نعم! اللقاحات كوفيد-19 آمنة وفعالة.
- غالبًا ما تكون عدوى كوفيد-19 أخف عند الأطفال، إلا أن بعضهم قد يمرض بشدة أو يعاني من مشاكل صحية دائمة.
- قد ينقل الأطفال الفيروس للآخرين. ساعد في حماية أسرته من خلال تطعيم نفسك وأطفالك.



أين يمكن أن يتلقى طفلي اللقاح؟

اسأل طبيب طفلك أو صيدلية محلية أو قم بزيارة [VaccinateLACounty.com](https://www.vaccinateLACounty.com) لإيجاد موقع تطعيم بالقرب منك. ابحث عن عيادات اللقاح المتنقلة في مدرسة طفلك. لا تحتاج العديد من مواقع التطعيم إلى موعد مسبق. اتصل بمركز اتصال إدارة الصحة العامة على الرقم 833-540-0473 إذا احتجت إلى مساعدة في إيجاد مركز لقاح، أو وسيلة لنقل إلى موقع تطعيم، أو لطلب التطعيم المنزلي لطفل ملتزم المنزل. يعمل مركز الاتصال يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى 8:30 مساءً. تتوفر المعلومات بلغات متعددة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عن طريق الاتصال بالرقم: 2-1-1



ما الأعراض الجانبية؟

- يتلقى الأطفال جرعة اللقاح ذاتها التي يتلقاها البالغون وقد يشعرون بالأعراض الجانبية نفسها.
- قد تشمل الأعراض الجانبية التهاب أو احمرار الذراع، أو الشعور بالتعب، أو ارتفاع درجة الحرارة (الحُمى)، أو القشعريرة، أو الصداع، أو آلام العضلات. لن يشعر الجميع بهذا الأعراض.
- الأعراض شائعة وتشير إلى أن الجهاز المناعي لطفلك يقوم ببناء الحماية المطلوبة.
- قد تؤثر هذه الأعراض على قدرة طفلك على القيام ببعض الأنشطة اليومية، إلا أنها تختفي في غضون أيام قليلة.



لقاحات كوفيد-19

ما يجب على أولياء الأمور معرفته



هل لقاحات كوفيد آمنة للأطفال؟

- لن يصاب طفلك بمرض كوفيد-19 بسبب تلقيه للقاح. لا يحتوي أي من اللقاحات على الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19.
- خضعت اللقاحات لاختبارات على عشرات الآلاف من جميع الأعمار، والألوان، ومن يعانون من أمراض مختلفة أكدت أنها آمنة.
- اتبع القائمون على تطوير اللقاحات كل خطوة مطلوبة للتأكد من أن اللقاح **آمن وفعال**.
- عانى عدد قليل، معظمهم من المراهقين والشباب، من التهاب في القلب (التهاب عضلة القلب والتهاب غشاء القلب "التامور") بعد الحصول على لقاح فايزر أو موديرنا، إلا أن هذا أمر نادر للغاية. كما كانت معظم الحالات خفيفة واستجابت بشكل جيد للعلاج والراحة. يعد التهاب عضلة القلب والتهاب التامور أكثر شيوعاً لدى من يصابون بمرض كوفيد-19، وقد تكون الأخطار التي يتعرض لها القلب من عدوى كوفيد-19 أكثر حدة.
- **تفوق فوائد اللقاح أخطاره.**
- لا يوجد دليل على أن لقاح كوفيد-19 يؤثر على نمو المراهقين أو خصوبتهم في المستقبل.
- إذا كانت لديك أسئلة أو مخاوف، تحدث إلى طبيب طفلك.



قبل أن يتلقى طفلك اللقاح

- تحدث إلى طفلك عن اللقاح وأعراضه الجانبية المحتملة وما يمكنه أن يتوقعه خلال زيارته لمركز التطعيم.
- تأكد أن مركز التطعيم الذي تتوجه إليه يقدم لقاح فايزر.
- تحقق لمعرفة الطريقة التي يجب أن تتبعها لتقديم **موافقة ولي الأمر**.
- تأكد أن طفلك يتلقى اللقاحات الروتينية الأخرى. يمكن إعطاء لقاح كوفيد-19 في الوقت نفسه، قبل اللقاحات الروتينية الأخرى أو بعدها.



بعد تلقي اللقاح

- يُعتبر طفلك قد تلقى **اللقاح الكامل** بعد أسبوعين من تلقيه الجرعة الثانية من لقاح فايزر. يستغرق الجسم وقتاً لبناء المناعة.
- بمجرد أن يتلقى طفلك اللقاح الكامل، سيجميه هذا عند زيارته أصدقاءه، أو ممارسته للرياضة، أو سفره لرؤية العائلة، أو عند عودته إلى المدرسة.
- إذا تلقى طفلك اللقاح الكامل، لن يحتاج إلى الحجر الصحي إذا أصيب أحد أصدقاءه، أو أحد أفراد الأسرة، أو معلمه، أو زميله بمرض كوفيد-19.

