




### چه زمانی باید دوز دوم واکسن خود را دریافت کنم؟

در صورت دریافت واکسن کووید-19 Pfizer یا Moderna، برای تکمیل سری اولیه به 2 دوز نیاز خواهید داشت. بهترین زمان دریافت دوز دوم سری اولیه به وضعیت فردی شما بستگی دارد.

#### اگر زیر 65 سال هستید و سیستم ایمنی‌تان ضعیف نیست:

- دریافت دوز دوم سری اولیه 8 هفته پس از دوز اول، ممکن است برایتان سودمند باشد، به‌ویژه اگر فرد مذکر 12-39 ساله هستید. علت این امر آن است که وجود فاصله زمانی طولانی‌تر بین دوز اول و دوم ممکن است میزان محافظت ناشی از واکسن‌ها را افزایش و خطر نادر ابتلا به میوکاردیت (التهاب عضله قلب) را کاهش دهد. جوانان مذکر (12-39 سال) در معرض بیشترین خطر ابتلا به میوکاردیت قرار دارند.
- چنانچه زودتر به کامل‌ترین حفاظت نیاز دارید، باید دوز دوم سری اولیه خود را پیش از موعد دریافت کنید: حداقل 3 هفته بعد از دوز اول Pfizer خود و حداقل 4 هفته بعد از دوز اول Moderna خود. نمونه‌های این مورد در صورتی است که انتشار وسیعی در محلی که زندگی می‌کنید، کار می‌کنید یا مسافرت می‌کنید وجود داشته باشد و/یا اگر بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری شدید قرار دارید.
- اگر مطمئن نیستید که کدام زمان‌بندی برای وضعیت شما مناسب‌ترین است، با پزشکتان صحبت کنید.

#### اگر دچار نقص ایمنی متوسط یا شدید هستید، و/یا سن‌تان بیش از 65 سال است



- شما باید دوز دوم سری اولیه خود را پیش از موعد دریافت کنید- حداقل 3 هفته بعد از دوز اول Pfizer خود و حداقل 4 هفته بعد از دوز اول Moderna خود
- اگر دچار نقص ایمنی هستید، حداقل 4 هفته بعد از دوز دوم سری اولیه خود، باید یک دوز سوم سری اولیه خود را دریافت کنید.

اگر برای دریافت دوز دوم خود دیر اقدام کرده اید، سعی کنید هرچه سریع‌تر آن را دریافت کنید. شما می‌توانید دریافت سری واکسن را از جایی که قطع کردید ادامه دهید. نیازی نیست از نو شروع کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر، به نشانی [ph.lacounty.gov/covidvaccineschedules](https://ph.lacounty.gov/covidvaccineschedules) مراجعه نمایید.