



COVID-19 백신: 화이자 및 모더나

기본 접종의 2차 백신 접종 시기

화이자 또는 모더나 백신의 2차 접종을 언제 받아야 하나요?

기본 접종 중 2차 접종을 받을 최적의 시기는 개인 상황에 따라 다릅니다.



귀하가 만 65세 미만이고 면역 저하 상태가 아닌 경우:

- 특히, 만 12~39세 남성의 경우 1차 접종 받고 8주 차 이후에 2차 기본 접종을 받으면 도움이 될 수 있습니다. 1차 접종과 2차 접종 사이의 기간이 길수록 백신의 효과가 향상되고 희귀 심근염(심장 근육의 염증) 발생의 위험성도 낮춰줄 수 있기 때문입니다. 젊은 남성(만 12-39세)은 심근염에 걸릴 위험도가 가장 높습니다.
- 더 빠르게 완전한 보호를 받아야 한다면, 화이자 1차 접종 받고 최소 3주 경과 후에, 모더나 1차 접종 받고 최소 4주가 경과한 후에 2차 기본 접종을 맞아야 합니다. 예를 들어, 거주지, 근무지 또는 여행하는 곳에서 확산세가 높은 경우 및/또는 중증 질환으로 발전할 가능성이 더 높은 경우
- 귀하의 상황에 가장 적합한 2차 백신 접종 시기가 확실하지 않은 경우 의사와 상담하십시오.

귀하가 중등증 또는 위중증의 면역 저하 상태이고/상태이거나 만 65세 이상인 경우

- 2차 기본 접종은 더 일찍 받아야 합니다. - 화이자 1차 접종 받고 최소 3주 후 및 모더나 1차 접종 최소 4주 이후
- 면역 저하자인 경우 2차 기본 접종 받고 최소 4주 이후에 3차 기본 접종도 받아야 합니다.



백신 2차 접종 시기를 놓친 경우 가능한 한 빨리 접종 받으십시오. 처음부터 다시 백신 접종을 받을 필요가 없으며, 마지막으로 중단되었던 접종 차수에 이어서 맞을 수 있습니다.

자세한 정보는 ph.lacounty.gov/covidvaccineschedules 를 참고하십시오.