



¿CUÁNDO DEBERÍA RECIBIR MI SEGUNDA DOSIS DE VACUNA?

El mejor momento para recibir la segunda dosis de la serie primaria depende de su situación individual.


Si tiene menos de 65 años y no tiene un sistema inmunológico débil:

- Puede beneficiarse de recibir su segunda dosis 8 semanas después de su primera dosis primaria, especialmente si es un hombre de 12 a 39 años. Esto se debe a que pasar más tiempo entre la primera y la segunda dosis puede aumentar la protección que ofrecen las vacunas y reducir el ya raro riesgo de miocarditis (inflamación del músculo cardíaco). Además, también reduce el raro riesgo de miocarditis. Los hombres más jóvenes (de 12 a 39 años) tienen el mayor riesgo de contraer miocarditis.
- Debería recibir su segunda dosis primaria antes si necesita la protección más completa antes: al menos 3 semanas después de su primera dosis de Pfizer y al menos 4 semanas después de su primera dosis de Moderna. Ejemplos de esto son si hay mucha propagación donde vive, trabaja o viaja y/o si tiene un mayor riesgo de sufrir una enfermedad grave.
- Hable con su médico si no está seguro de cuál es el mejor momento para su situación.



Si usted: Está moderado o severamente inmunocomprometido y/o es mayor de 65 años

- Debería recibir su segunda dosis primaria antes - al menos 3 semanas después de su primera dosis de Pfizer y al menos 4 semanas después de su primera dosis de Moderna.
- También debería recibir una tercera dosis primaria al menos 4 semanas después de su segunda dosis primaria si está inmunocomprometido.



Si se tarda en recibir su segunda dosis, trate de recibirla lo antes posible. Puede retomar la serie de vacunas donde la dejó. No necesita empezar de nuevo.

Para obtener más información, consulte ph.lacounty.gov/calendariosdevacunasdeCOVID.