



COVID-19 疫苗：輝瑞和莫德納

接種第二劑初始劑量疫苗的時機

我應該什麼時候接種第二劑疫苗？

接種第二劑初始劑量的最佳時間取決於你的個人情況。




如果你的年齡在 **65 歲** 以下，並且你的免疫系統也不薄弱：

- 在接種第一劑初始劑量疫苗的 8 週後再接種第二劑初始劑量疫苗可能對你有好處，尤其是如果你屬於 12-39 歲的男性群體。這是因為若接種第一劑和第二劑初始劑量疫苗の間隔時間較長，可能會增加疫苗提供的保護力度，並降低本已罕見的心肌炎（心肌的炎症）發生的風險。年輕男性（12-39 歲）患心肌炎的風險最高。
- 如果你需要更早期獲得最全面的保護，你應該更早期地接種第二劑初始劑量疫苗：即在接種第一劑輝瑞疫苗的至少 3 週後，或在接種第一劑莫德納疫苗的至少 4 週後。需要更早期接種的實例包括，如果你生活、工作或旅行的地點有很高的病毒傳播率，並且/或如果你罹患嚴重疾病的風險更高。
- 如果你不確定哪個接種時機最適合你個人的情況，請諮詢你的醫生。

如果你的免疫功能中度或嚴重受損且/或年齡在 **65 歲** 及以上：

- 你應該更早期地接種第二劑初始劑量疫苗 即在你接種第一劑輝瑞疫苗的至少 3 週後，或在你接種第一劑莫德納疫苗的至少 4 週後。
- 如果你的免疫功能受損，你還應該在接種第二劑初始劑量疫苗的至少 4 週後再接種第三劑初始劑量疫苗。



如果你接種第二劑疫苗的時間晚了，請儘量儘快接種。你可以繼續接種所停止的疫苗劑量。你不需要重新從第一劑疫苗開始接種。

欲瞭解更多資訊，請參閱 ph.lacounty.gov/covidvaccineschedules。